

## 1. Изменения органов дыхания

### **В дыхательных путях:**

- атрофия слизистой оболочки верхних дыхательных путей;
- замедление движения ворсинок эпителия;
- уменьшение секрета желез, повышение его вязкости;
- появление участков, где многорядный мерцательный эпителий замещается на многослойный плоский;
- повышение порога кашлевого рефлекса,
- снижение самоочищения дыхательных путей (замедление мукоцилиарного клиренса и снижение эффективности иммунных реакций);
- расширение просвета гортани, уменьшение натяжения голосовых связок (голос понижается и становится дребезжащим);
- смещение гортани книзу (в среднем на один позвонок).

### **В респираторных отделах:**

- разрушаются межальвеолярные перегородки, расширяются альвеолярные ходы — развивается старческая эмфизема (повышенная воздушность легочной ткани);
- в межальвеолярных перегородках разрастается соединительная ткань — формируется пневмосклероз;
- изменяются сосуды легких, уменьшается их кровенаполнение;
- увеличивается объем мертвого пространства и остаточный объем;
- уменьшается жизненная емкость легких;
- нарушения газообмена приводят к уменьшению в артериальной крови содержания кислорода (возрастная гипоксемия);
- учащается дыхание - до 22-24 в минуту в старческом возрасте.

### **Изменения костно-мышечного скелета грудной клетки:**

- уменьшается подвижность реберно-позвоночных сочленений;
- в гиалиновых хрящах ребер откладываются соли кальция;
- ослабевают мышцы (из-за дистрофических изменений);
- усиливается грудной кифоз;
- грудная клетка теряет эластичность, ее передне-задний диаметр становится равным поперечному (форма грудной клетки приближается к цилиндрической).

## 2. Изменения сердечно-сосудистой системы

### **В сердечной мышце:**

- уменьшается сократительная способность миокарда;
- расширяются полости сердца и отверстия между ними, увеличиваются конечные систолический и диастолический объемы – возрастная систолическая гипертензия;
- развивается гетеротропная гипертрофия клеток, снижается их сократительная способность, удлиняется изометрическая фаза сокращения, снижается индекс расслабления;
- снижается систолический и минутный объем крови (даже в обычных условиях сердце работает со значительным напряжением);
- увеличивается соединительно-тканная строма (развивается кардиосклероз), уменьшается растяжимость миокарда;
- развивается слабость синусового узла (водителя ритма первого порядка), замедляется проведение возбуждения по миокарду — увеличивается продолжительность систолы, число мышечных сокращений становится реже;
- интенсивность тканевого дыхания снижается, активизируется анаэробный распад гликогена, что приводит к уменьшению энергетического запаса сердечной мышцы;
- в глубокой старости мышечные волокна атрофируются, может развиваться заместительное ожирение.

### **В сосудистом русле:**

- снижается эластичность артерий из-за уплотнения их стенки разросшейся соединительной тканью — повышается сосудистое сопротивление и уровень диастолического давления;
- ухудшается питание, снижается энергетический обмен в сосудистой стенке, повышается содержание в ней натрия, что приводит к активизации атеросклеротического процесса, склонности к вазоконстрикции (сужению просвета сосудов);
- понижается тонус и эластичность венозной стенки, венозное русло расширяется, замедляется ток крови в нем (возврат крови к сердцу снижен, высок риск тромбообразования);
- уменьшается число функционирующих капилляров — они становятся извилистыми, увеличивается артериовенозное шунтирование крови (переход крови из артериального русла сразу в вены через анастомозы, минуя капилляры), утолщается базальная мембрана капилляров, затрудняя транспорт веществ через нее;
- лимфатические сосуды становятся менее эластичными, в них возникают участки расширения;
- мозговое и коронарное кровообращение снижается в меньшей степени, чем печеночное и почечное;
- при старении повышается чувствительность рецепторов сосудов к адреналину, приводя к частому развитию спастических реакций и способствуя резким перепадам артериального давления;
- увеличивается время общего кругооборота крови из-за нарастания емкости сосудистого русла и снижения сердечного выброса.

Снижается адаптивная функция сердечно-сосудистой системы, в значительной степени обусловленная неполноценной работой гемодинамического центра (на корковом, диэнцефальном и столовом уровнях). **Безусловно-рефлекторные реакции сердечно-сосудистой системы на раздражители различного рода:** мышечную активность, стимуляцию интерорецепторов (перемена положения тела, глаза - сердечный рефлекс), световое, звуковое, болевое раздражение — у старых людей возникают с большим латентным периодом, выражены значительно меньше, характеризуются волнообразным и затяжным течением восстановительного периода.

### **3. Изменения органов пищеварения**

#### **В полости рта:**

- происходит постепенная утрата зубов, зубы приобретают желтоватый оттенок и различную степень стертости, снижаются барьерные свойства тканей зубов;
- атрофируются альвеолярные отростки челюстей, изменяется прикус (становится прогнатическим);
- уменьшается объем и секреция слюнных желез — это приводит к постоянному чувству сухости во рту, нарушению формирования пищевого комка, склонности к воспалению слизистой оболочки;
- снижается ферментативная насыщенность и защитные свойства слюны;
- нарушается пережевывание и переваривание пищи;
- язык становится плоским и гладким из-за атрофии мышц и сосочков; повышаются пороги вкусовой чувствительности.
- постепенно *атрофируются миндалины лимфоэпителиального глоточного кольца;*

**Пищевод** удлиняется и искривляется из-за кифоза позвоночника, мышечный слой его подвергается частичной атрофии, что может привести к нарушению глотания и высокому риску образования грыж (выпячиваний);

**Желудок** уменьшается в размерах, принимает положение ближе к горизонтальному;

- сокращается число секреторных клеток в железах (меньше вырабатывается соляной кислоты, ферментов и желудочного сока в целом);
- нарушается кровоснабжение стенки желудка, снижается его моторная функция.

### **В тонком кишечнике:**

- сглаживается рельеф слизистой оболочки за счет снижения высоты ворсинок и их количества на единицу площади (уменьшается поверхность пристеночного пищеварения и всасывания);
- из-за снижения секреции пищеварительных соков и их ферментативной насыщенности нарушается глубина и полнота переработки пищи.

### **В толстом кишечнике:**

- из-за атрофии мышечных клеток высок риск развития дивертикулов (множественные выпячивания стенок кишки, что приводит к каловым камням и субъективному дискомфорту, а в дальнейшем может осложниться перфорацией);
- развивается склонность к запорам (атоническим);
- изменяется микрофлора кишечника: увеличивается количество гнилостных бактерий, уменьшается — молочнокислых, что способствует росту продукции эндотоксинов и нарушению синтеза витаминов группы В и К.

### **Печень:** с возрастом уменьшается масса;

- снижаются функциональные возможности гепатоцитов, что приводит к нарушению белкового, жирового, углеводного и пигментного обменов, снижению антитоксической (обезвреживающей) функции печени;
- в клетках снижается количество гликогена, накапливается липофусцин;
- изменяется кровоток в печени: часть синусоидных капилляров спадается, образуются дополнительные пути от междольковых вен к центральным венам.

**Желчный пузырь** увеличивается в объеме, тонус мускулатуры и двигательная активность пузыря снижаются — нарушается своевременное поступление желчи в кишечник и повышается риск камнеобразования из-за застоя желчи.

**Поджелудочная железа** снижает внешне- и внутрисекреторную функцию из-за снижения кровоснабжения и уменьшения числа железистых клеток и клеток островкового аппарата (у людей старшего возраста более высокий уровень глюкозы крови).

## **4. Изменения органов мочевого выделения**

### **В почках:**

- уменьшается число функционирующих нефронов (к старости на 1/3-1/2), формируется возрастной нефросклероз;
- падает уровень почечного кровообращения, клубочковой фильтрации, понижаются экскреторная (азото-, водо-, электролитно - выделительная) и концентрационная (из-за изменений канальцевой части нефрона) функции почек;
- ослабевает связочный аппарат почек как явление спланхноптоза (опущения внутренних органов).

### **В мочевыводящих путях:**

- почечные чашечки и лоханка теряют эластичность, скорость и силу движений (из-за атрофии части мышечных волокон);
- мочеточники расширяются, удлиняются, становятся более извитыми, стенка их утолщается, замедляется эвакуация мочи из верхних мочевых путей;
- нарушение моторной функции мочевыводящих путей и несовершенство физиологических сфинктеров обуславливают частые в старости рефлекс (обратный (против нормального направления) ток мочи);

• утолщается стенка мочевого пузыря, снижается его емкость, ослабевает тормозное влияние коры головного мозга на рецепторы мочевого пузыря во время ночного сна — это приводит (наряду с увеличением ночного диуреза, связанного с изменениями в сердечно-сосудистой системе) к росту частоты позывов к мочеиспусканию ночью.

Нередко развиваются различные **типы недержания мочи (инконтиненция)**:

а) **стрессовый тип** — при кашле, смехе, упражнениях, связанных с повышением внутрибрюшного давления;

б) **побудительный тип** — невозможность задержать сокращение мочевого пузыря (обусловлено нарушением нервной регуляции его деятельности);

в) **избыточный тип** — вызван функциональной недостаточностью внутреннего и наружного сфинктеров мочевого пузыря;

г) **функциональный тип** — при отсутствии привычных условий для мочеиспускания или при физических, психических нарушениях у пациента. Уменьшение сократительной способности внутреннего и наружного сфинктеров мочевого пузыря, продольной мускулатуры задней уретры, обеднение сосудами венозного сплетения пузыря ослабляют функцию замыкательного аппарата мочевого пузыря, а изменение пузырно-уретрального угла (из-за нарушения связочного аппарата уретры) облегчает выделение мочи из пузыря и также способствует развитию недержания.

### **5. Изменения эндокринной системы**

При старении изменяется продукция гормонов, связывание гормонов с белками, рецепция клетками-мишенями.

**В гипоталамусе** происходит накопление в ядерных клетках липофусцина, ослабевает нейросекреторная реакция на рефлекторные (кожно-болевые) или нервные афферентные раздражения и усиливается реакция на гуморальные раздражители (например адреналин).

**В гипофизе** увеличивается продукция «тропных» гормонов передней доли — тиреотропного (ТТГ), соматотропного (СТГ), адренокортикотропного (АКТГ) и других. В целом, изменения в различных звеньях гипоталамо-гипофизарной системы носят неравномерный характер.

Процесс старения в **вилочковой железе** начинается в период полового созревания, и к пожилому возрасту почти полностью исчезает ее корковое вещество, что приводит к значительному сокращению возможностей иммунной системы.

**В щитовидной железе** увеличивается соединительно-тканная строка, уменьшается число фолликулов и фиксация щитовидной железой йода, что приводит к снижению в крови уровня тироксина и трийодтиронина (до 25-40% после 60 лет) — развиваются признаки гипотиреоза.

**В надпочечниках** после 30 лет происходит структурная перестройка коры, увеличиваются пучковая (глюкокортикоиды) и сетчатая (продуцирует половые гормоны) зоны, в 50-70 лет кора надпочечников представлена преимущественно пучковой зоной, при этом снижается общая продукция гормонов надпочечников, их адаптационные резервы.

Ухудшается кровоснабжение **поджелудочной железы**, уменьшается число клеток островков Лангерганса и биологическая активность вырабатываемого в них инсулина. При старении повышается уровень сахара в крови.

**Половые железы.** С 18 до 80 лет в семенниках уменьшается активность сперматогенеза; в плазме крови постепенно снижается содержание тестостерона и увеличивается уровень тестикулярных эстрогенов. Масса яичек уменьшается, однако либидо и половая потенция может отмечаться у мужчин до 80-90 лет. В предстательной железе соединительно-тканнные и мышечные элементы преобладают над секреторными, возрастает масса и склонность к гипертрофии. В яичниках происходит атрофия фолликулов, они сморщиваются, постепенно превращаясь в плотные фиброзные пластинки (начиная с 30 лет снижается секреция эстрогенов, весьма быстро – с климактерического периода), а после 50 лет — возрастает секреция гонадотропинов).

## **6. Изменения кожи**

Старение кожи начинается после 20 лет, нарастает после 40 лет, становится выраженным к 60-75 годам и особенно проявляется в 75-80 лет:

- характерно образование морщин, борозд, складок (начиная с открытых частей тела — лица, шеи, рук);
- поседение волос, облысение, усиленное разрастание волос в области бровей, наружного слухового прохода;
- в эпидермисе уменьшается ростковый и увеличивается роговой слой;
- коллагеновые волокна становятся грубее, местами гомогенизируются;
- эластические фибриллы утолщаются, укорачиваются, нарастает их лизис;
- сглаживаются соединительно-тканые сосочки, уменьшается подкожно-жировой слой, появляются пигментные пятна;
- сквозь истонченную, в целом, кожу просвечивают кровеносные сосуды;
- уменьшается количество сальных и потовых желез, кожа становится сухой;
- существенно суживается просвет сосудов дермы, их стенки склерозируются;
- в целом кожа истончается, существенно нарушаются ее защитные свойства;
- повышается порог тактильной чувствительности.

## **7. Возрастные изменения системы кроветворения**

### **Красный костный мозг:**

- костномозговое пространство постепенно заполняется жировой тканью;
- снижается активность эритропоэтической (кроветворной) ткани, но сохраняется созревание эритроцитов;
- созревание гранулоцитов существенно не изменяется (незначительно снижается нейтрофилоцитопоз);
- имеет место лимфоидная гиперплазия;
- уменьшается число мегакариоцитов, но они функционируют более длительно и экономно.

### **Вилочковая железа (тимус):**

- начиная с 16-20 лет тимус подвергается обратному развитию, что сопровождается уменьшением числа лимфоцитов, особенно в корковом веществе долек, появлением липидных включений в соединительнотканых клетках и разрастанием жировой ткани;
- значительно атрофируется корковое вещество;
- нередко нарушается гематотимусный барьер.

### **Селезенка:**

- утолщаются ретикулярные волокна, формируются коллагеновые волокна;
- постепенно атрофируется красная и белая пульпа, ослабевают пролиферация Т-лимфоцитов;
- количество лимфоидных узелков и размеры их герминативных центров уменьшаются;
- больше накапливается железосодержащего фермента, отражающего гибель эритроцитов.

### **Лимфатические узлы:**

- утолщение соединительнотканной капсулы и трабекул, атрофия миоцитов и снижение моторной функции лимфатического узла;
- признаки жировой дистрофии поверхностных лимфатических узлов, приводящие к затруднению лимфотока;
- в корковом веществе уменьшается количество лимфобластов, повышается число макрофагов, тучных клеток и эозинофилов;
- стабилизация процессов старения в лимфатических узлах наступает в возрасте 60-75 лет.

### **Кровь:**

- увеличивается продолжительность жизни эритроцитов до 154 суток;
- незначительно уменьшается число эритроцитов у долгожителей;
- постепенно уменьшается площадь эритроцитов и снижается уровень ферментов и гемоглобина в цитоплазме этих клеток;
- падает число лейкоцитов и их активность;
- у лиц старше 70 лет уменьшается число тромбоцитов и ускоряется их инволюция;
- в плазме крови увеличивается содержание фибриногена, у глобулина и уменьшается уровень альбуминов;
- изменяются реологические свойства крови, СОЭ повышена до 30-40 мм в час.

## **8. Изменения опорно-двигательного аппарата**

### **В мышцах:**

- уменьшение количества мышечных волокон и их диаметра;
- увеличение жировых включений и липофусцина в мышечных клетках;
- уменьшение числа функционирующих капилляров и нейронов на одну мышечную ед.;
- снижается АТФ-азная активность мышц.

### **В костях:**

- остеопороз в результате белкового дефицита и уменьшения содержания минеральных веществ в тканях (потеря костной ткани – с 25 лет, ускоряется в постменопаузе с темпом 2-3% в год ( в общем 30 и более %) – патологические переломы; дегенеративные изменения в дёснах, зубах («оголение» пришеечной зоны зубов; множественный кариес;
- увеличение эпифизов трубчатых костей, образование костных разрастаний (гиперостозов и экзоостозов), утолщение сохранившихся костных балок;
- усиливается кифоз грудного отдела и лордоз поясничного отдела позвоночника - изменение осанки, боли в спине;
- уплощается и деформируется свод стопы;
- уменьшается рост (в среднем на 3-8 см).

### **В суставах:**

- кальциноз сухожилий и суставных сумок;
- прогрессирующая дегенерация суставного хряща, межпозвонковых дисков, сужение суставной щели, уменьшение внутрисуставной жидкости;
- деструктивные изменения в межпозвонковых дисках и прилежащих тканях (развивается остеохондроз).

## **9. Возрастные изменения органа зрения**

- Снижение эластичности хрусталика и цинновой связки, ослабление ресничной мышцы, приводящее к нарушению аккомодации;
- увеличение размеров хрусталика и изменение его формы, прозрачности –тенденция к катаракте;
- старческая дальнозоркость — пресбиопия (в среднем на 1 D каждое десятилетие, начиная с 40 лет);
- затруднение циркуляции внутриглазной жидкости, высокий риск глаукомы (повышения внутриглазного давления);
- ограничение полей зрения, снижение адаптации к темноте;
- ослабление тонуса круговой мышцы глаза, насосной функции слезных канальцев — нарушение своевременности оттока слезы.

### **10. Возрастные изменения органа слуха**

- гиперостоз и сужение внутреннего слухового отверстия;
- обызвествление сочленений слуховых косточек и волокон базальной мембраны улитки;
- снижение амплитуды движений барабанной перепонки;
- нарушение проходимости слуховой трубы;
- повышение порога восприятия звуков, особенно высокой частоты — развитие пресбиакузии;
- ослабление функции вестибулярного аппарата, снижение чувства равновесия — головокружения, падения.

### **11. Возрастные изменения обоняния и вкуса**

- постепенное уменьшение количества рецепторов,
- снижение обоняния – риск отравлений угарным газом, недоброкачественной пищей;
- снижение вкуса (он на 2/3 зависит от вкуса) – употребление избыточного количества соли, сахара.

### **12. Возрастные изменения температурной, тактильной и болевой чувствительности**

- уменьшение количества рецепторов на единицу поверхности тела,
- снижение всех видов чувствительности, в том числе давления на ткани, болевой: нарастание рисков ожогов, переохлаждения;
- снижение проприорецепторной чувствительности (от внутренних органов): боль отсрочена от времени возникновения повреждения ткани и менее интенсивна(!) – проблематична диагностика острых хирургических заболеваний.

### **13. Возрастные изменения ЦНС**

- постепенно уменьшается общее число нервных клеток: от 10-20% у 60 летних, до 50% у стариков;
- замедляется кровоток, снижается потребление кислорода и усвоение глюкозы;
- ухудшаются процессы регенерации;
- нарастают дистрофические изменения в клетках нервной ткани: в нейронах накапливается липофусцин (продукт окисления ненасыщенных жирных кислот), развивается старческий амилоидоз мозга (появление в клетках особого белка — амилоида);
- развивается очаговая демиелинизация нервных волокон, что приводит к замедлению проведения возбуждения по нервному волокну и увеличению времени рефлекса;
- в различных отделах нервной системы нарушается обмен нейромедиаторов (дофамина, серотонина и норадреналина) — это увеличивает риск развития депрессии и болезни Паркинсона;
- в конечном мозге отмечаются атрофические изменения извилин, расширяются борозды (это наиболее выражено в лобной и височной долях);
- ослабляются тормозные влияния коры головного мозга на деятельность подкорковых образований;
- медленно угасают старые условные рефлексы и трудно вырабатываются новые;
- снижается память, преимущественно кратковременная, что, наряду с другими возрастными изменениями органов и систем, уменьшает способность к обучению.