

## **Особенности лечения заболеваний мочевыделительной системы у лиц старшей возрастной группы.**

Частота пиелонефритов у геронтов составляет 15% от заболеваемости, в то время как в зрелом возрасте хронический пиелонефрит встречается в 5—7% случаев. Рост заболеваемости пиелонефритом определяется возрастной перестройкой организма и большей вероятностью инфицирования МВП.

### Основные причины инфицирования МВП у геронтов:

—циститы, кольпиты, простатит, бронхолегочная патология, зубные гранулемы, гнойничковые заболевания кожи;

—в процессе старения отмечается уменьшение числа нефронов, разрастание соединительной ткани, снижение содержания К, витаминов в клетках и тканях, нарастающая гипоксия почечной ткани.

Все это приводит к повышенной чувствительности ткани почек к приему медикаментов, особенно анальгина, на фоне которого иногда формируются почечные абсцессы, инфекционным заболеваниям; —большое значение в развитии пиелонефрита имеет возрастное понижение функции мочевыводящих путей. Потеря эластичности, расширение мочеточников, склонность к рефлюксам — изменяет эвакуаторную деятельность, способствуя развитию патологии;

—возрастные изменения усугубляются заболеваниями, приводящими к перегибу, обтурации мочевыводящих путей — это опухоли кишечника и гениталий, деформация скелета, каловые камни;

—имеет значение снижение механизмов защиты, как общей, так и местной;

-- большую роль в развитии патологии МВС играет атеросклероз и сахарный диабет.

В старости, особенно у мужчин, чаще встречается односторонний вторичный пиелонефрит.

### **Хронический пиелонефрит**

**Пиелонефрит — неспецифическое бактериальное заболевание почечных лоханок и чашечек с последующим вовлечением в процесс интерстиция почек, кровеносных сосудов и клубочков, приводящее в итоге к развитию хронической почечной недостаточности.**

**ЛЕЧЕНИЕ. Немедикаментозное лечение.** 1. Диетотерапия строится с учетом принципов геродиететики. В рационе должно быть достаточное количество полноценного белка, должен быть достаточным питьевой режим, жидкости в рационе, в зависимости от состояния, должно быть до 1,5—2 л.

2. В лечении пиелонефрита большое значение придается постельному режиму, а также теплу. Пациенту необходимо рекомендовать носить **согревающий пояс**, в палате должно быть комфортная температура, постельное белье должно быть теплым. Медицинская сестра обязана создать в палате комфортную температуру, организовать условия для соблюдения постельного режима пациентом.

### **Медикаментозная терапия:**

—назначаются антибактериальные препараты с частой сменой каждые 7—10 дней, лечение проводится до стойкого снижения лейкоцитов и исчезновения бактерий в моче. В дальнейшем лечение проводится прерывистыми курсами уросептиков до 6 месяцев.

—между курсами рекомендуется проводить лечение НПВП.

—для повышения дренажной функции почек рекомендуется назначать пассивную гимнастику — диуретики (фуросемид) растительные диуретики.

—при отсутствии эффекта рекомендуется подключать кортикостероиды. Обязательным условием считается санация очагов инфекции.

Вне обострения рекомендуется санаторно-курортное лечение на питьевых курортах — Железноводск, Кисловодск.

### **Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ).**

**Доброкачественная гиперплазия предстательной железы** — это заболевание, характеризующееся разрастанием парауретральных желез, приводящее к нарушению мочеиспускания с возможным развитием ХПН.

Лечение зависит от стадии

**В стадии компенсации** возможна **медикаментозная терапия**, после тщательного урологического исследования: проведения урофлоуметрии, определения показателей кровотока в простате.

Из медикаментов рекомендуется применение следующих препаратов:

- 1.ингибиторы 5- α редуктазы;
- 2.а-1-ареноблокаторы
- 3.гормональные препараты.

К первой группе относятся финастерид, который улучшает мочеиспускание, уменьшает массу железы. Побочное действие: снижение потенции, снижение либидо. К этой же группе относится препарат пермиксон, готовится из карликовой пальмы Сабаль. Не снижает половую функцию.

Представителями второй группы является отечественный препарат празозин, который в дозе 1мг снимает обструкцию в шейке мочевого пузыря в течение суток. К этой группе относятся альфузозин, омник, кардура. К растительным препаратам этой группы относится танденан, готовится из коры африканской сливы.

У 70% пациентов применение этих препаратов дает устойчивый эффект. К побочному действию препаратов относят: понижение АД, а также быстрое восстановление всех симптомов после отмены препаратов. Танденан лишен этих побочных действий.

Имеется опыт лечения аденомы гомеопатическим препаратом гентос. Для облегчения опорожнения мочевого пузыря в некоторых случаях применяют тыквеол, обладающий легким мочегонным, желчегонным и противовоспалительным действием.

В течение последних лет бурное развитие получили новые технологии в лечении ДПГП. К ним относятся лазерная абляция ткани простаты, Микроволновая гипертермия, эндоскопическая инцизия, применение высоко-фокусированного ультразвука. Отдаленные последствия этих методов еще мало известны, но их меньшая травматичность и безопасность по сравнению с хирургическими вмешательствами делает их использование предпочтительным в гериатрической практике, особенно когда лекарственная терапия уже не показана из-за отсутствия эффекта, а хирургический метод не приемлем из-за имеющихся противопоказаний.

**Медицинская сестра обязана проводить санитарно-просветительную работу среди мужчин, указывая на необходимость регулярного осмотра у уролога. При наличии заболевания медицинская сестра может проводить школу для пациентов, обучая их правилам личной гигиены, создавая комфортное состояние при нахождении пациента в стационаре.**

### **Недержание мочи (инконтиненция)**

**Лечение** индивидуально.

1.Питание. При избыточном весе рекомендуется снизить вес. Рекомендуется ограничить в разумных пределах прием жидкости, отказаться от курения, приема крепкого чая, кофе.

2.Рекомендуются **упражнения** для укрепления мышц тазового дна, передней брюшной стенки, диафрагмы. 3.В некоторых случаях эффективна электростимуляция мышц тазового дна, применение пессариев.

**Медикаментозная терапия.** Применяются следующие препараты: пропателин, оксibuтинин (дриптан). Но прием дриптана, особенно у старых женщин, не показан из-за побочных явлений: сухость во рту, запор, снижение зрения, тошноты. Противопоказан он при наличии глаукомы, нарушении оттока мочи, атонии кишечника.

На сегодняшний день одним из основных методов лечения недержания мочи при напряжении, по-прежнему остается **хирургический**. Наиболее часто применяется уроцистоцервикопексия.

В настоящее время наиболее щадящей является методика использования свободной синтетической петли. В основе этой методики лежит новая теория о механизмах закрытия уретры, согласно которой уретра у женщин размыкается в средней части, а не в области мочевого пузыря. Операция проводится под местной анестезией, она мало травматична и не дает длительного болезненного периода после операции, легко переносится геронтами, имеющими сочетанную патологию.

Применяются также эндоскопическое введение биополимеров в подслизистый слой шейки мочевого пузыря, но это метод не всегда оправдывает себя.

Когда все средства исчерпаны, можно рекомендовать пациентам использовать специальные прокладки — дайперсы, выпускаемые фирмой «Тэна» и германской фирмой «Моликар». Дайперсы выпускаются разными по объему, они могут вмещать от 300 до 800 млл. жидкости. Применение дайперсов значительно улучшает положение стареющего человека, снимает чувство зависимости и одиночества.

### **Хроническая почечная недостаточность. ХПН**

## **ХПН — патологическое состояние, обусловленное необратимой потерей массы функционирующих нефронов и других тканей почки.**

**Консервативное лечение ХПН состоит из симптоматического и патогенетического.**

**1. Диета.** Несколько веков длятся споры вокруг диетического ограничения белка; с одной стороны полное исключение белка из пищи резко снижает содержание азотистых шлаков в крови, с другой — ограничение белка приводит к разрушению белковых структур собственного тела, мышечной дистрофии, снижающей качество жизни. Отсутствие в растительной пище некоторых незаменимых аминокислот усиливает дистрофию.

Энергетическая ценность пищи может быть повышена за счет жиров и углеводов, но, при наличии печеночной недостаточности, повышенное содержание жиров в диете геронтов не показано. В настоящее время для предотвращения этих неприятностей предложено включать в рацион пищевые добавки «Реналайт», одна чашка которого содержит 35% необходимой нормы питания. Помимо Реналайта используется российская добавка Кетостерил в виде таблеток. Эти пищевые добавки снижают уровень азотистых шлаков крови, предупреждают прогрессирование анемии, замедляют наступление мышечной дистрофии.

**Медикаментозная терапия.** 1. Для снижения уремической интоксикации рекомендуется применять препараты из группы энтеросорбентов: отруби, фитомед, полифепан, энтеросгель.

Прекрасным сорбентом является хофитол, изготавливаемый из листьев артишока, он обладает мочегонным, желчегонным, действиями, кроме того, связывает токсические продукты как экзогенного, так и эндогенного происхождения. Как леспенефрил, хофитол обладает легким антисептическим действием.

При почечной недостаточности важное значение имеет чеснок, постоянное употребление чеснока лицами, страдающими заболеваниями МВС снижает частоту обострений и замедляет развитие ХПН(!).

2. Для профилактики ДВС и улучшения микроциркуляции в почечных клубочках рекомендуется введение гепарина, фраксипарина или трентала, тиклида, препаратов никотиновой кислоты. Аспирин при ХПН не показан.

При возникновении кожного зуда необходим **плазмоферез**.

Рекомендуется также **симптоматическая терапия**, т. е. назначение по необходимости антибактериальных препаратов, сердечных гликозидов, мочегонных.

**Большое значение в профилактике этого состояния имеет сохранение пациента на работе.** Уход с рабочего места приводит к резкому ухудшению качества жизни и быстрой гибели человека.

### **Советы женщинам при недержании мочи**

Проблема недержания мочи — зачастую женская. Во многом ее определяет мускулатура тазового дна. Уже с 35 лет каждая женщина должна заняться собой, чтобы не страдать в старости от этого недуга.

Улучшить контроль над мочеиспусканием позволяют специальные упражнения и правильное дыхание.

Известно, что легче напрягать мышцы тазового дна во время выдоха. Попробуйте на выдохе напрячь мышцы тазового дна и кашляните.

Заниматься упражнениями, направленными на укрепление мышц тазового дна можно в любой обстановке, в том числе и вне дома. Где бы вы ни находились, сохраняйте правильную осанку. В положении сидя необходимо держать таз, как можно ближе к заднему краю сиденья, мышцы ног должны быть расслаблены, именно в таком положении проводимые упражнения дадут больший эффект.

В положении стоя ноги поставить на уровень плеч, расслабить мышцы бедер, и поочередно переносить тяжесть тела с одной ноги на другую.

Следует позаботиться о защите мышц спины при подъеме тяжестей. Наклоняясь, спину держать прямо, груз поднимать на выдохе.

Для укрепления мышц вокруг уретрального канала можно делать следующие упражнения: сядьте на унитаз, начните мочиться, во время мочеиспускания постарайтесь напрячь мышцы между копчиком и лонем, чтобы прервать мочеиспускание.

Все упражнения необходимо проводить несколько раз в день. Безусловно, одно два занятия не помогут. Только регулярные занятия, ваше упорство может привести к успеху.

Упражнения лучше проводить во второй половине дня, но не позднее, чем за два — три часа до сна. Каждое упражнение желательно повторить 10-12 раз.

Выполняя упражнения, соблюдайте следующие правила:

1. Живот должен быть мягким и расслабленным. Одновременно должны напрягаться только мышцы тазового дна: заднего прохода, влагалища, мышцы вокруг мочеиспускательного канала.
2. Обязательно следите за правильным дыханием. Нарушение ритма дыхания снижает эффект. Заметьте, что эти упражнения не требуют специального оборудования.

### **Советы по профилактике недержания мочи**

1. Постарайтесь снизить вес, так как лишние килограммы провоцируют учащение мочеиспускания;
2. Ешьте продукты, богатые клетчаткой (отруби, свежие овощи) — это спасает от запоров. Чем реже вы оправляетесь, тем хуже работает срамной нерв, обеспечивающий работу мочевого пузыря;
3. Откажитесь от курения, так как никотин ослабляет сфинктеры мочевого пузыря;
4. Кофе — злейший враг. Снижение дозы кофеина в 74% случаев снижает симптомы недержания мочи;
5. Откажитесь от приема пива, оно стимулирует и функцию кишечника и функцию мочевого пузыря;
6. Не поднимайте тяжести;
7. Тренируйте мочевой пузырь по часам, сначала посещайте туалет каждые 30 мин., затем увеличьте интервалы, постепенно доведя их до максимума;
8. Добивайтесь полного опорожнения мочевого пузыря, через 2-3 мин, по окончании мочеиспускания постарайтесь еще помочиться;
9. Попробуйте заниматься по методике Кегеля: по очереди втягивайте в себя то влагалище, то прямую кишку. Эти упражнения можно делать где угодно.
10. Пользуйтесь для утоления жажды отварами семян укропа, чаги, зверобоя, брусники, шиповника, клюквенного морса, имбиря с апельсиновым соком, черной смородины с крапивой, листа земляники с лепестками розы.