

## Особенности лечения заболеваний опорно-двигательной системы у лиц старшей возрастной группы

Патология костей и суставов относится к числу наиболее частых болезней человека. Эти болезни являются ведущей причиной нетрудоспособности, часто имеют хроническое течение и сопровождаются постоянными и периодически усиливающимися болями. Они ограничивают физическую активность, ухудшая экономическое и психологическое положение в семье. Патология костей и суставов относится к заболеваниям, которые оказывают неблагоприятное воздействие на общество, вследствие потери раб.силы и огромных затрат на уход, обеспечение и соц. поддержку пациентов.

Основные направления по преодолению социальных и экономических проблем, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: 1.повышение информированности населения. 2.обучение населения. 3.обучение врачей. 4.поддержку пациентов с патологией костей и суставов. 5.расширение исследований.

### Деформирующий остеоартроз

#### ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА:

Из-за отсутствия сосудов хрящ не способен к регенерации, как большинство безсосудистых тканей. Поэтому требуется особый подход к лечению.

В настоящее время разработаны методы генного лечения заболевания, но пока эти методы не получили широкого клинического распространения. Дальнейшее развитие генетической терапии могут дать полезные методы для защиты и регенерации тканей.

Тактика лечения состоит из 3-х компонентов.

- 1.Мероприятия, направленные на разгрузку суставов.
- 2.Купирование синовита.
3. Профилактика, направленная на замедление прогрессирования заболевания.

Для разгрузки суставов применяется **диетотерапия.**

Пациентам рекомендуют достаточное количество белка с равным содержанием животного и растительного происхождения, обогащенная полиненасыщенными жирными кислотами класса «ОМЕГА - 3». Норма углеводов соответственно возрасту со снижением легко усвояемых углеводов, снижение количества натрия, достаточное количество витаминов, минералов.

Необходимо включать в рацион антиоксидантный комплекс витаминов (А, Е, С), комплексный препарат «Олигогал Se», пищевая добавка СЕЛЕН-АКТИВ.

Необходимо включать в рацион продукты сои, авокадо. Эти продукты снижают разрушение хряща. *Эффект от диетотерапии проявляется не ранее, чем через 2 месяца. Длительное лечение диетотерапией обеспечивает снижение болевых ощущений, улучшает общее самочувствие.*

Разгрузочный режим предусматривает не только снижение веса, но и устранение длительных статических нагрузок, придание телу среднефизиологического положения, опора на трость, ношение наколенников при нестабильности суставов.

**Медикаментозная терапия** представлена двумя основными классами лекарственных препаратов:

- ◆ Симптоматические препараты немедленного действия;
- ◆ Препараты, структурно модифицирующие хрящ.

К первой группе относятся неопиоидные (парацетамол) и центральные (трамадол) анальгетики, а также НПВП, кортикостероиды для внутрисуставного введения, препараты гиалуроновой кислоты. Простые анальгетики применяются на ранней стадии заболевания или при интенсивных болях в дополнение к НПВП. Внутрисуставное введение кортикостероидов рекомендуется не более двух раз в год, так как они усиливают дегенерацию хрящевой ткани.

Наиболее широкое применение нашли НПВП, применение их объясняется тем, что постоянно персистирующий процесс в периартикулярных тканях поддерживает болевой синдром, и только снятие боли облегчает подвижность суставов и улучшает субъективно состояние пациентов. Кроме того, НПВП тормозят синтез простагландинов. Потому прием этих препаратов дает побочные явления со стороны желудочно-кишечного тракта, способствует порой повышению АД. Эти явления можно снизить, применяя пролонгированные формы препаратов. Для профилактики эзофагита рекомендуется принимать препараты стоя, запивать достаточным количеством воды за 30 минут до еды. Наименьшее количество побочных явлений наблюдается при применении ибупрофена, диклофенака, индометацина, кетопрофена. Лечение начинают с половинной дозы.

Рекомендуется не курить при применении этих препаратов.

Структурно модифицирующие препараты или хондропротекторы, подразделяют на 3 группы.

- 1.Препараты, воздействующие на хрящ артрон, румалон, мукартин; из морепродуктов готовится препарат альфлутон; диацерин, пиасклидин — готовятся из экстрактов сои и авокадо.
- 2.Воздействующие на хрящ и костную ткань- артепарон, не рекомендуется при выраженном атеросклерозе.

3. Воздействующие на субхондральную пластинку — глюкозамин-сульфат, хондроитинсульфат (структур), ДО-НА — рекомендуются в течении 3-х месяцев.

4. Из группы цитаминов — хондрамин.

В перспективе разрабатываются препараты ингибиторы металлопротеиназы:  $\alpha$ -1-антитрипсин,  $\beta$ -2-микроглобулин. В качестве ингибиторов металлопротеиназы применяются также антибиотики тетрациклинового ряда.

**Из физиотерапевтических средств рекомендуют:** озокерит, парафинотерапия;

Для укрепления мышц — электромиостимуляция.

Рекомендуют **массаж** больших мышечных групп. При проведении массажа, капсулу сустава не рекомендуется массировать, так как это может способствовать распространению процесса.

**(!) Крайне неверное представление** — это разработка сустава, разгонка солей.

**ЛФК.** Проводится в положении сидя и лежа, фиксирование позы не должны превышать 5—7 минут. Обучение вторичной профилактике заболевания в гериатрической практике может проводить медицинская сестра в школе, созданной для пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы. Медицинская сестра может рекомендовать следующие мероприятия: 1. Ходьба с опорой на трость.

2. Мягкие стельки в обуви.

3. Снижение массы тела.

4. Ограничение физической нагрузки.

5. Хирургические ортопедические операции.

6. Применение биостимуляторов, витаминов и других геронтопротекторов.

7. Аппликации бишофита, димексида, мазей отвлекающего действия таких как: индометациновая, бутадионовая, а также кремы: Софья, Ревматин, Аура, Франт, Тигровый глаз.

## Остеопороз

**Профилактика остеопороза** делится на **первичную** и **вторичную**. В связи со значительным распространением заболевания, за рубежом широко распространяются программы профилактики остеопороза, в которых предусматривается, прежде всего, ознакомление врачебной общественности с данной проблемой, а также санитарное просвещение населения.

Предусматривается воспитание у населения здорового образа жизни. Предусматривается обучение населения правильному питанию и ведению активного образа жизни. Уже в 9—10 лет родители должны обеспечить своему ребенку достаточное содержание продуктов с усвояемым кальцием. Известно, что для нормального развития костной ткани ребенок должен получать в этом возрасте 1,2 г кальция. Поэтому необходимо включать в рацион добавки, содержащие кальций.

Наибольшее количество кальция содержится в молоке, сыре, йогурте. Так в одном стакане молока содержится 300 мг кальция, в 100 г сыра содержится 1 г кальция.

У лиц в возрасте 20—30 лет потребность в кальции составляет 1 г в сутки, **у лиц пожилого и старческого возраста потребность в кальции 1,3 г в сутки.**

Для лиц старшей возрастной группы для профилактики остеопороза рекомендуется остеопороза придерживаться кальциевой диеты. В рацион геронтов необходимо включать сухофрукты: курагу, чернослив; творог, орехиминдаль, кунжут, овощи, зелень — петрушку, сельдерей укроп; рыбу речных пород (судак, щука, треска), можно консервированную и вяленую. Обязательно в течение суток выпивать до литра минеральной воды. Рекомендуется устроить на кухне или в столовой натюрморт из овощей и фруктов в виде светофора. Применять Кальций-Д3 Никомед, карбонат кальция, хлорид кальция. Рекомендуется исключить из рациона чай, кофе. Необходимо отказаться от курения, избегать тяжелых физических нагрузок, упражнений с отягощением, с наклоном туловища и головы, избегать подъема тяжестей перед собой в согнутом состоянии.

В то же время **включение дозированных, адекватных физических нагрузок, имеет важное значение. Большое значение имеет ходьба пешком до 10 км.** Занятия лечебной физкультурой должны начинаться с разогревающих, релаксирующих упражнений в течение 5 минут. Затем необходимы «охлаждающие» упражнения (5 мин). Рекомендуется заниматься плаванием, особенно важно во время плавания заниматься упражнениями, усиливающими мышечную силу, что повышает способность сохранять координацию и предупреждать падения.

**Пациентам, страдающим остеопорозом, рекомендуется ограничить тяжелые физические нагрузки, подъем тяжестей, избегать резких поворотов головы и туловища. Рекомендуется ограничить прием снотворных и седативных средств. Не рекомендуется далеко уходить от дома без сопровождающих, в транспорте рекомендуется занимать места у кабины водителя.**

Рекомендуется регулярно наблюдаться у невропатолога, окулиста, своевременно менять очки и проводить рекомендуемое лечение.

**Л Е Ч Е Н И Е:** Лечение остеопороза — задача сложная, так как заболевание поздно диагностируется, протекает длительно, со спонтанными обострениями и ремиссиями. Как лечение, так и профилактика остеопороза направлены на: — замедление или прекращение потери костной массы; — предотвращение переломов;

— нормализацию костного ремоделирования;

— уменьшению болевого синдрома, расширению двигательной активности;

— улучшению качества жизни.

**Немедикаментозное лечение.** Большое значение имеет **рациональное питание**, сбалансированное по солям кальция, фосфора, белку.

**Адекватная физическая нагрузка, ЛФК.** Обязательным условием лечения является ежедневная ходьба по 10—15 минут 3 раза в день. В зависимости от состояния больного прогулки увеличивают до 1,5-2 часов. У пациентов, пренебрегающих ходьбой, быстро развиваются контрактуры. *Большое значение имеет обучение пациента правильному вставанию из постели.*

**Важным компонентом лечения является ношение ортезов (корсетов).** Главная задача ортезов — восстановление баллонной функции живота, что позволяет разгрузить позвоночник.

**Массаж** входит в комплексную терапию остеопороза, назначают массаж не раньше 4—6 месяцев от начала лечения, применяют только поглаживание и растирание.

**Медикаментозное лечение.** 1. Для снятия боли применяется препарат миокальцик в виде инъекций по 100 ЕД в/м ежедневно или в виде спрея интраназально. Хорошие результаты дает препарат ксидофон в виде аппликаций или мазей и кремов, выпускаемых нашей промышленностью (Ксения, Антика, Геомакс, Ксанти).

2. Для поддержания гормонального равновесия и предупреждения костной резорбции рекомендуется применение эстрогенов. Но право выбора приема этих препаратов лежит на пациентке. В настоящее время выпускается препарат **биболон**, синтетический аналог эстрогенов, применение которого не дает риска развития рака эндометрия.

3. Всем пациентам, независимо от степени тяжести заболевания рекомендуется прием витаминов и фитопрепаратов. Всем без исключения, в зимнее время рекомендуется прием вит. Д. Широко применяются активные формы вит. Д — кальцитриол, альфакальцидол, а -ДЗ ТЭВА, остеогенон.

4. Остеотропные медикаменты назначают после лабораторного исследования и остеоденситометрии позвоночника и шейки бедра.

Широкое применение нашла группа бисфосфонатов: фосамакс, алендронат. Эти препараты предотвращают остеопороз.

Применяются для лечения фториды, усиливающие костеобразование: фторид натрия, двунатриевый монофлюорофосфат в сочетании с препаратами кальция.

Геронтам рекомендуют прием комбинированного препарата Кальций Д3 Никомед, карбонат кальция, Кальций Сандос. **Прием препаратов, содержащих кальций необходимо отнести на вечерние часы, так как в это время усиливается суточный ритм потери кальция из костной ткани, если содержание кальция в кишечнике резко падает.** Вечерний прием кальция предупреждает циркадное усиление костной резорбции ночью(!).

При приеме препаратов, содержащих кальций, усиливаются запоры(!). Для профилактики их необходимо рекомендовать достаточное употребление жидкости и продуктов, содержащих клетчатку.

### **Советы медицинской сестры при заболеваниях суставов**

1. Разминка для суставов. В возрасте после 55 лет следует начать с пеших прогулок, сочетая их с занятиями в бассейне. Заниматься желательно не менее 3 раз в неделю. Если вы давно не занимались гимнастикой, первые прогулки не должны превышать 5 км в день.

2. Следите за погодой. Если местность, где вы проживаете, постоянно преподносит вам сюрпризы, то необходимо следить за всеми изменениями погоды и планировать свои занятия, учитывая погодные условия, чтобы не пропустить эти занятия, потому что начинать снова, всегда сложно.

3. Постарайтесь снизить вес до идеального, так как излишний вес усиливает нагрузку на суставы и усиливает процессы разрушения в суставных тканях. Если вы похудеете на 2—3 кг, нагрузка на суставы нижних конечностей сразу снизится.

4. Старайтесь ходить легким шагом. Представьте, что вы парите над землей.

5. Помните, что обезболивающие препараты имеют много побочных явлений, поэтому принимайте их только после консультации врача, прибегайте к мерам, снижающим риск осложнений, а именно:
- а) запивайте препараты большим количеством воды;
  - б) принимайте препараты в положении стоя, на крайний случай — сидя, это снизит риск прилипания препарата к слизистой оболочке пищевода и снизит риск ее повреждения.
6. Откажитесь от каблучков. Высокие каблуки увеличивают нагрузку на суставы поясничной области, суставы ног, на лодыжки и стопы. Купите удобные прогулочные туфли.
7. Употребляйте в пищу рыбу: судак, треска, щука, стерлядь, лосось, сельдь, сардины. Эти рыбы содержат легко усвояемый кальций и полиненасыщенные кислоты класса омега-3, благодаря чему снижаются боли в суставах и восстанавливается поврежденный хрящ.
8. Включайте в пищу льняное, горчичное, оливковое масла, они также содержат жирные кислоты класса Омега-3.
9. Откажитесь от курения, это пристрастие снижает уровень женских половых гормонов, что способствует развитию заболеваний суставов.
10. Откажитесь от кофеина. Значительное потребление кофе, черного чая способствует развитию остеопороза, ухудшает деятельность сердечно-сосудистой системы. -
- Помните, что развитие многих заболеваний можно избежать, используя советы медицинских работников, многие из которых проверены веками в клинической практике.

### **Советы медицинской сестры по предупреждению травматизма**

#### **Как садиться, как вставать:**

Повернитесь к креслу спиной, икрами прикоснитесь к краю кресла. Посмотрите направо, налево, убедитесь, что стоите прямо по центру кресла.

Продолжая касаться икрами кресла, подвиньте ступни ног как можно дальше под кресло, при этом стопы должны быть несколько разведены в стороны.

Согните ноги в коленях и в то же время наклонитесь вперед, приподняв голову (иначе может закружиться голова). Уложите руки на подлокотники и опуститесь в кресло.

При соблюдении этих правил риск получить травму сводится к нулю.

При сидении необходимо также соблюдать некоторые правила, иначе вы можете вызвать болевые ощущения в позвоночнике. В доме необходимо иметь кресла с твердым сидением и прямой спинкой, купив такое кресло, вы только выиграете.

При сидении ягодицы и плечи плотно прижмите к спинке кресла, а стопы плотно прижмите к полу.

При плохом физическом состоянии сесть в кресло легче, чем подняться. Потому и здесь необходимо соблюдать некоторые правила.

Прежде всего, не пытайтесь подняться, если сидите глубоко в кресле. Сначала подайте туловище несколько вперед, то есть скользите по креслу к краю, но так, чтобы не выпасть из него. Для этого поднимите левое бедро и пятку левой ноги, перенесите вес тела на пальцы левой ноги и правое бедро. Теперь подайте левое бедро вперед и опустите левую пятку. Прделайте то же самое с правым бедром. Попеременно двигая левым и правым бедрами, передвиньтесь к краю кресла.

Подсуньте обе ноги под кресло, чуть расставьте стопы. Согнитесь в талии и наклонитесь вперед, подбородок держите вперед и вверх (не опускайте голову ниже уровня сердца).

Поставьте руки на подлокотники кресла. Перенесите всю тяжесть тела на руки и ноги, мягко оттолкнитесь руками и ногами и встаньте.

Правильно садиться — великое дело. Годы идут, и мы все большее время проводим сидя, даже если ведем относительно активный образ жизни, и уметь садиться так, чтобы не получить травму, — это очень важно.

#### **КАК САДИТЬСЯ И ВСТАВАТЬ БЕЗ ПОМОЩИ РУК**

Встаньте спиной к креслу, коснитесь икрами центра сидения. Убедитесь, что кресло находится прямо за вашей спиной. Приблизьте стопы к креслу, слегка разведите их в стороны.

Наклоните плечи вперед, одновременно подайте вперед и колени (а не вниз, иначе тело уйдет вниз) ягодицы идут назад, в сторону кресла. Подбородок смотрит вперед и вверх.

На случай потери равновесия, держите руки над подлокотниками. Теперь опускайтесь в кресло.

Вставать из кресла надо тем же способом, со следующей разницей. Когда вы поднимаетесь, руки находятся над подлокотниками, согнитесь в талии вперед и сделайте энергичное движение грудью, которое поможет вам подняться из кресла.

Повторите упражнение для закрепления два — три раза.

Успех придет быстрее, если вы будете выполнять упражнения общеоздоровительного цикла.

## **В В Е Р Х И В Н И З П О Л Е С Т Н И Ц А М**

Для людей физически крепких, ходьба по лестнице — это прекрасное упражнение для тренировки. Но если тело ослабло, то лестница является значительным препятствием для человека.

Если вам трудно ходить по лестнице, начните тренировку с одного пролета. Поднимаемся вверх.

Встаньте у основания лестницы и возьмитесь за перила ближайшей к ним рукой. Поднимите левую ногу и поставьте ее на первую ступеньку. Обопритесь на руку, лежащую на перилах, подтяните правую ногу и тоже поставьте ее на ступеньку (не пытайтесь поднимать ногу, лучше подтягивайте ее).

Поднимитесь на следующую ступеньку, причем начинайте всегда с ноги, которая ближе к перилам. Это самый надежный способ поднятия по лестнице, при котором вы всегда сохраняете равновесие.

При спуске используйте тот же принцип.

Возьмитесь рукой за перила. Сделайте первый шаг ногой, следите, чтобы не зацепиться пяткой за ступеньку, иначе можно оступиться и упасть.

Опустите на эту ступеньку следующую ногу, проследите за тем, чтобы пятка этой ноги не зацепилась за ступеньку.

Чтобы научиться ходить по лестнице без перил, специальных упражнений не надо, просто надо научиться пользоваться лестницей с перилами и укреплять свое тело упражнениями основного комплекса.