

Особенности лечения заболевания сердечно - сосудистой системы у лиц старшей возрастной группы

Растущий интерес к проблемам гериатрической кардиологии объясняется следующими факторами:

1. Относительным и абсолютным увеличением числа заболеваний ССС лиц старшего возраста.
2. Более четкими представлениями о роли физиологических возрастных изменений в развитии таких заболеваний, как атеросклероз, ГБ и др.
3. Необходимостью учитывать клинические особенности болезней ССС в формировании другой возрастной патологии, умению организовать профилактику этих заболеваний у лиц старшей возрастной группы.

Атеросклероз - одно из наиболее распространенных хронических заболеваний, проявление которого чаще встречается в старших возрастных группах. Однако, **атеросклероз** не является проявлением биологии возраста. По современным представлениям это **различные комбинации изменений интимы, сочетающиеся с изменением меди сосудистой стенки.**

Атеросклероз - мультифакторное хроническое заболевание, хар-ся системным поражением в основном артерий, обусловленное обменными нарушениями в тканях сосудистой стенки.

ЛЕЧЕНИЕ: Рациональное лечение заболевания невозможно без устранения факторов риска.

Основой патогенетического лечения заболевания является коррекция нарушенного баланса липидов.

Поэтому медработник должен убедить пациента, что программа лечения состоит из немедикаментозного лечения, и только при отсутствии эффекта присоединяется медикаментозная терапия.

1. Немедикаментозное лечение: 1.1. Диетотерапия. Особое значение диетотерапия имеет при II Б — V типе гиперхолестеринемии. **Основные принципы диетотерапии:**

1. В рационе снижается содержание жиров на 30—40%, чем достигается снижение калорийности;
2. В рационе должно быть повышено содержание продуктов, содержащих полиеновые жирные кислоты;
3. Снижают содержание холестеринсодержащих продуктов;
4. Снижают содержание моно и дисахаридов;
5. Ограничивают потребление алкогольных напитков.

1.2. Занятия физической культурой. Мышечные упражнения повышают потребление энергии, снижают уровень липидов, что является частью лечения. Стареющему человеку можно рекомендовать утреннюю гимнастику, ходьбу, медленный бег, туризм, охоту, рыбалку. Но все занятия подбираются индивидуально, в зависимости от состояния человека. Нарастание нагрузки должно идти постепенно.

2. Медикаментозная терапия: к медикаментозным препаратам предъявляются следующие требования:

1. Препараты должны длительно понижать уровень липидов;
2. Расщеплять и выводить липиды из тканей;
3. Препараты не должны быть токсичны;
4. Иметь мало побочных действий.

Для лечения и медикаментозной профилактики применяются следующие группы препаратов:

1. фибраты (клофибрат, мисклерон) и препараты никотиновой кислоты (никошпан, ксантинол никотинат, аминалон, никоверин, никотиновая кислота в виде таблеток и инъекционного раствора) — снижают уровень триглицеридов;

2. ингибиторы синтеза холестерина, к ним относятся статины (ловостатин, зокор, мевакор, соматостатин, пробукол); секвестранты желчных кислот (холестирамин, колестипол, вазозин).

(!) При назначении фибратов и холестирамина у пациентов возможно появление жидкого стула, на что должна обращать внимание медицинская сестра.

(!) При назначении препаратов никотиновой кислоты, медицинская сестра должна предупредить пациента, что принимать их нужно обязательно после еды, так как при применении препаратов возможна резкое расширение мелких сосудов, сопровождающееся чувством жжения и гиперемии кожи.

В настоящее время большое значение приобретают некоторые БАД, снижающие уровень липидов крови. К ним относятся эйконол, посеидонол — готовятся из жира морской рыбы северных морей; полиенопима, селен, пищевые отруби, «Виардо».

3. Оперативные методы лечения: - когда все мероприятия оказываются неэффективными, рекомендуется **экстракорпоральное выведение холестерина из сосудистого русла.** В отдельных случаях применяется операция Бухвальда — **частичное илеошунтирование.** В тяжелых случаях рекомендуется **пересадка печени.**

4. Новым словом в лечении и проф-ке атеросклероза является генетическая коррекция холестерина.

Артериальная гипертония

Лечение: 1. Немедикаментозное лечение:

В лечении АГ большое значение придается 1.1. рационально подобранному питанию; 4-5 р/день малыми порциями. Предполагается обязательное ограничение поваренной соли, при необходимости рекомендуется ограничить и воду.

В комбинированном лечении большое значение отводится адекватно подобранной 1.2. физической нагрузке. Необходимо также проведение 1.3. физиотерапии. В частности можно рекомендовать обливание раствором морской соли «Ахиллес», которую извлекают из недр Пермского моря.

2. Медикаментозное лечение ГБ у геронтов имеет свои особенности и не всегда оказывает эффект. **Причины малой эффективности лечения следующие:**

1. Падение интеллекта приводит к тому, что пациенты перестают воспринимать советы врача, забывают названия препаратов, путаются в дозировках. Имея дело с таким пациентом, **(!) необходимо составить памятку-рекомендацию пациенту или его родственнику по приему медикаментов;**

2. С возрастом возникает затруднение контроля АД в домашних условиях, особенно если человек живет один. Поэтому, необходимо **(!) рекомендовать пациенту приобрести тонометр-автомат**, позволяющий контролировать АД без затруднений;

3. С возрастом пациенты испытывают затруднения по ведению дневника наблюдения, где фиксируются изменения АД в течение суток, самочувствие пациента в момент повышения АД, а также точные дозировки препаратов, принятых пациентом. **(!) Необходимо обучить пациента плавному снижению АД, при этом диастолическое давление не должно снижаться ниже 80 мм. рт. ст.**

4. Дороговизна препаратов является следующей причиной, затрудняющей лечение ГБ.

2.1 В настоящее время наиболее эффективными препаратами считаются ИАПФ и группа нифедипина. В то же время эти препараты не всегда показаны геронтам. Так ИАПФ вызывают у пациентов кашель(!), а при наличии хронического бронхита усиливают его. Препараты группы нифедипина могут вызвать значительные изменения в миокарде, и кроме того, они могут вызвать внезапную смерть(!). Назначение этих препаратов требует усиление наблюдения за пациентом со стороны среднего медперсонала.

Поэтому при установлении диагноза назначается **2.2. комбинированная медикаментозная терапия**, так как именно комбинация препаратов способствует снижению АД и снижению числа осложнений, связанных с АГ. Комбинированная медикаментозная терапия уже необходима лицам с повышением АД более 140/90 мм. рт. ст.(!).

Рациональными считаются препараты, которые взаимно усиливают гипотензивный эффект, а также уменьшают побочное действие препаратов другой группы. Назначение комбинированной терапии требует от врача высокого мастерства, так необходим индивидуальный подбор препаратов, регулярный контроль за пациентом, и умение титровать дозу препарата, что очень часто не выполняется врачом. Поэтому в настоящее время созданы комбинированные препараты. К таким препаратам относятся: циак, капозид, коренитек, зесторитек, нолипрел, гизаар, диован, лот-рел, тарка, логимакс и многие другие.

Комбинированные препараты не только снижают частоту осложнений, но и по цене более доступны пациентам.

2.3. Кроме того, для лечения геронтов рекомендуют использовать тиазидовые диуретики в сочетании с калиевой диетой. Не рекомендуется использовать диуретики для монотерапии, но нужно помнить, что при комбинированной терапии, они позволяют значительно снизить дозу других препаратов. При назначении диуретиков, медицинская сестра должна предупредить пациента о необходимости соблюдать калиевую диету(!).

В настоящее время широкое применение нашел новый диуретический препарат арифон, который снижает АД плавно в дозе 25 мг в сутки. Арифон снижает систолическое давление, не воздействуя на диастолическое.

2.4. В гериатрической практике не отказываются от лечения такими препаратами, как адельфан и клофелин. На смену клофелину пришел препарат цинт, лишенный побочных действий клофелина, таких, как сухость во рту, синдром отмены.

(!) Важно научить пациента купированию первых признаков, свидетельствующих о развитии гипертонического криза. Ухудшение состояния, тяжесть в затылке, тупая головная боль, нарушение зрения, неуверенность

движений, тяжесть в области сердца нарастают медленно. Так же медленно нарастает АД. Обученный пациент знает действие гипотензивных препаратов на свою «персональную» гипертонию и поэтому может начинать лечение, не дожидаясь развития криза. При наличии мозговой симптоматики, необходимы диуретики. Своевременно начатое лечение облегчает течение криза, а порой предупреждает его тягостные следствия.

2.5. Часто при развитии ИГ наблюдаются тромбозы, поэтому необходимо рекомендовать пациенту ежедневно принимать аспирин в небольшой дозе, если нет противопоказаний(!).

2.5. Статины рекомендуются пациентам, имеющим общий холестерин более 5 ммоль/л.

Профилактика обострений ГБ заключается в регулярном осмотре пациентов, в зависимости от частоты и тяжести течения заболевания и коррекции лечения. Медицинская сестра должна своевременно пригласить пациента на осмотр.

Лечение ИБС у геронтов не отличается от такового у лиц среднего возраста. Но следует учесть возрастные изменения, а также то, что переносимость медикаментов с возрастом снижена, поэтому высок риск побочных явлений и сердечных осложнений. Программа лечения индивидуальна для каждого пациента. 1. Немедикаментозное лечение: Большое значение в лечении придается 1.1. диетотерапии 1.2. Обязательны занятия ЛФК.

2. Медикаментозное лечение: В программе медикаментозного лечения предусматриваются следующие принципы:

1. Достижение антиангинального эффекта;
2. Устранение аритмии;
3. Нормализация кровообращения; "
4. Улучшение реологических свойств крови.

Из препаратов, рекомендуемых геронтам, применяются в основном следующие группы:

1. Нитропрепараты пролонгированного действия, это изокет, изомак, изосорбид;
2. β -блокаторы, которые геронтам назначаются с крайней осторожностью из-за побочных явлений, таких как блокады различной локализации, дисфункция синусового узла, бронхоспазма. Препаратом выбора в гериатрической практике считается атенолол.

3. Блокаторы кальциевых каналов из группы нифедипина. Более показан коринфар, но нужно помнить, что его применение иногда может вызвать внезапную смерть.

4. ИАПФ — это группа каптоприла: энап, престариум, фозиналаприл и др.

Для улучшения реологических свойств крови рекомендуется ежедневный прием аспирина в малой дозе при отсутствии противопоказаний, или трентал, или тиклид курсами по 2 месяца три раза в год. Можно применять гиполипидемические препараты или пищевые добавки, регулирующие липидный обмен. Это могут быть отруби, продукты моря, особенно ихтионовая кислота, полученная из мяса северных морских рыб. Можно рекомендовать группу статинов — зокор, мевакор, ловостатин, липантил 200 и др.

Обязателен прием витаминных комплексов с микроэлементами — квадевит, гериоптил Н—3, геримакс.

3. Физиотерапия: Широкое применение нашли лазеротерапия, гипербароокситерапия, сухие углекислые ванны, магнитотерапия.

4. На Западе широко применяется хирургический метод лечения ИБС. В нашей стране отработана методика оперативных вмешательств, но она ограничена из-за недостатка материальных средств.

Советы медицинской сестры

Памятка пациенту, страдающему приступами стенокардии.

1. Положить под язык таблетку нитроглицерина (нитросорбит, капли В отчала).
2. Открыть форточку, или включить вентилятор.
3. Расстегнуть одежду на груди.
4. Сесть в удобную позу и расслабиться (методика быстрого расслабления мышц):
 - а) сделать глубокий вдох, задержать дыхание. Сделать выдох, полностью расслабиться.
 - б) закрыть глаза и вызвать какое либо приятное воспоминание;
 - в), сделать вдох, обняв себя руками крест-накрест, сжав за плечи как можно сильнее. Сделать выдох, расслабиться;
 - г) полежать в постели, расслабившись, сколько хочется, затем потянуться, словно после пробуждения;

д) провести самовнушение, используя четкие формулы, например: «каждый день я чувствую себя здоровым», или «мое сердце работает хорошо, я уверен в этом». Сформулированную фразу можно произносить про себя или вслух, желательно представлять себя здоровым и бодрым.

е) сформулировав фразу, необходимо верить в нее.

5. Использовать методику оживления приятных воспоминаний.

6. Для того чтобы вызвать приятные эмоции, необходимо иметь под рукой фотографии любимых людей или любимые предметы.

7. Если боли не снимаются, необходимо обратиться к работникам «скорой помощи»!

Обучение пациента и его родственников медицинской сестрой при заболеваниях сердечно - сосудистой системы:

1. Обучить измерению АД;

2. Обучить вести дневник самонаблюдения, отмечая в нем эпизоды болей; подъема АД и причину подъема; эпизоды сердцебиения и причины; время приема медикаментов и влияние их на боли или АД; количество принятой и выделенной жидкости.

3. Подобрать и разучить с пациентом комплекс ЛФК, научив его методу самоконтроля во время проведения занятия (подсчет пульса до начала занятия, в середине и в конце занятия).

4. Рассказать о диете № 10, о роли продуктов, входящих в состав диеты, составить вместе с пациентом меню на неделю, используя «Справочник медицинской сестры по диетологии».

5. Рассказать о калиевой диете и ее применении.

6. Обучить пациента проведению разгрузочных дней, применяя картофельную или яблочную диеты.

7. Составить пациенту памятку по приему медикаментов и поместить ее на видное место.

8. Обучить пациента правилам приема медикаментов, указав на возможные побочные явления и возможности их устранения.

9. тветует длителтвенников контролю за приемом медикаментов пациентом;

10. Объяснить, что несвоевременное или бесконтрольное применение может привести пациента к инвалидности и зависимости от них.

Провести контроль знаний через 1—2 недели. В случае невыполнения предложенных мероприятий, узнать причину и попытаться еще раз провести обучение пациента и его родственников.

Особенности инфаркта миокарда у геронтов

Инфаркт миокарда — заболевание, которое характеризуется образованием некротического очага в сердечной мышце в результате абсолютного нарушения коронарного кровообращения, приводящего к резкому падению сократительной способности миокарда. Как и стенокардия, инфаркт миокарда у геронтов протекает атипично(!).

Лечение: Принципы лечения:

1. купировать болевой приступ;

2. ограничить зону некроза;

3. поддержать сократительную способность миокарда;

4. для профилактики тромбоэмболии назначить гепарин 5 —10 ЕД в/в, затем перевести на аспирин.

Основные задачи медикаментозной терапии в домашних условиях:

1. предотвращение или снижение частоты болевых приступов;

2. повышение толерантности к нагрузкам;

3. улучшение качества жизни;

4. снижение риска развития повторного ИМ;

5. увеличение продолжительности жизни.

Из медикаментов применяются:

1. Нитраты;

2. ИАПФ;

3. Диуретики;

4. Сердечные гликозиды;

5. Малые дозы β блокаторов.

В лечении следует применять индивидуальный подход к пациенту в зависимости от особенностей организма.

Реабилитация: 1. психологическая — установка на активный образ жизни;

2. физическая — раннее расширение режима, усаживание в постели в первые дни заболевания. Подбор тренирующего режима в последующем с помощью велоэргометра;

3. социальная — восстановительная терапия проводится с подключением родственников. Рекомендуется включать пациента в домашнюю деятельность.

Большое значение придается физической активности. Рекомендуются ежедневные прогулки по 30 мин. и более в обычном режиме.

Хроническая сердечная недостаточность — это патологическое состояние, обусловленное падением сократительной способности миокарда, приводящее к нарушению гемодинамики.

ЛЕЧЕНИЕ: 1. Немедикаментозное лечение: 1.1. диетотерапия, направленная на снижение веса. Рекомендуется ограничить калорийность за счет ограничения жира, особенно животного происхождения, увеличить потребление овощей и фруктов, содержащих соли К, Mg. Ограничить соли натрия в разумных пределах, ограничить жидкость в зависимости от степени тяжести ХСН.

1.2. адекватная физическая нагрузка. Рекомендуются физические упражнения, прогулки пешком, адекватная домашняя работа.

2. Медикаментозная терапия:

1. ИАПФ;

2. диуретики;

3. сердечные гликозиды,

4. малые дозы β -блокаторов.

Лечение должно быть индивидуальным, в зависимости от этиологического фактора.

(!) Медицинская сестра должна хорошо знать возможные осложнения медикаментозной терапии и при появлении необычной симптоматики ставить лечащего врача в известность. Так, при назначении β -блокаторов возможен бронхоспазм, появление нарушений ритма(!).

(!) При назначении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента возможно появление кашля, явлений бронхоспазма.

(!) При назначении диуретиков, в связи с большой потерей солей К, возможны нарушения ритма, резкое падение давления, обезвоживание организма.

(!) При назначении сердечных гликозидов возможны задержка жидкости в организме, появление нарушения ритма по типу экстрасистолии, появление диспепсических явлений.

Медицинская сестра, владеющая сестринским процессом, сможет организовать помощь пациенту так, чтобы предупредить возможность побочных явлений или снизить вероятность их возникновения.