

## Особенности лечения заболеваний крови у лиц гериатрического возраста

**Анемии** – это большая группа заболеваний, характеризующихся снижением гемоглобина в единице объема крови, нередко сопровождаемое снижением числа эритроцитов.

Анемия – это наиболее частый синдром, встречающийся в гериатрии; частота ее

Железодефицитная анемия – наиболее частая форма в гериатрической практике; чаще встречается у мужчин (чаще возникают кровотечения).

**Лечение** (эффективно только после устранения причин (!), что не всегда возможно полностью), принципы: 1).выяснить и устранить причину; 2). обеспечить полноценную диету (белки и углеводы стимулируют, а жиры ухудшают усвоение Fe из смешанной пищи; ограничить прием растительной клетчаткой); 3).медикаментозная терапия на фоне диетотерапии. Препараты двухвалентного Fe (сорбифер дурулес, ферроплекс,тардиферон и др.) принимаются за 1 час до еды или не ранее чем через 2 часа после еды; всасывание Fe повышается при совместном приёме аскорбиновой (янтарной) кислоты, фруктозы (фруктовые кислые соки). (!)Некоторые лекарственные препараты (тетрациклины, антацидные препараты, препараты кальция) уменьшают всасывание железа. Препараты для парентерального введения геронтам рекомендуются только при подготовке к оперативным вмешательствам и при резком нарушении процессов всасывания Fe.

**Профилактика:** -санитарно-просветительная работа (разъяснение необходимости полноценного питания с достаточным употреблением тощих сортов мяса, вит.С); - профилактика хр. запоров (при запорах – низкий эффект лечения(!)).

В 12-дефицитная анемии - часто встречается у геронтов, особенно в сочетании с болезнями щитовидной железы и сахарным диабетом.

**Лечение** после определения причины:1). диета: овощи и фрукты; мясо, печень, сыр, яйца. 2). медикаментозное лечение: вит.В12 (цианокобаламин или оксикобаламин) 200-300 мкг. в/м. 1 раз в день 4-6 недель; затем закрепляющая терапия (1 р/неделю 2-3 мес).

Лейкозы – опухоли кроветворной ткани, первично поражающие костный мозг.

Хронический лимфолейкоз - хр. пролиферативное заболевание, морфологическим субстратом которого является повышенное образование морфологически зрелых В-, Т-, О- лимфоцитов вследствие увеличения срока их жизни.

**Лечение:** с учётом темпов развития заболевания и формы болезни.

**Важнейшая цель** – **максимальное продление жизни.**

В начальной стадии – выжидательная тактика без патогенетической терапии, **оптимизация образа жизни** (питание, посильная двигательная нагрузка и др.).

При ухудшении: Основные направления: **1.**

**Подавление опухолевого процесса:** **1.1.**

**цитостатики** (хлорбутин 6-10 мг. внутрь или циклофосфан 200-300 мг. в/мыш. 1 раз в день); или **полихимиотерапия** (комплекс цитостатиков и преднизолон) по схемам лечебных протоколов; **1.2. лучевая**

**терапия** в период резкого увеличения лимфоузлов.

**2. Борьба с иммунопатологическими цитопеническими состояниями и инфекционными осложнениями:**

2.1. антибиотики; гамма-глобулин; антистафилококковая плазма, интерферон – при инфекционных осложнениях; **2.2.**

гемотрансфузии – при тяжёлой анемии.  
**наблюдение** – у гематолога и гериатра.

«Д»

**Хронический миелолейкоз** - *хр. пролиферативное заболевание, морфологическим субстратом которого является повышенное образование гранулоцитов.*

**Лечение** (чаще – амбулаторно): *Цель – уменьшение массы опухолевых клеток.*

1. **Подавление опухолевого процесса:** 1.1. **цитостатики** (миелосан (милеран) 2-6 мг. в сутки; миелобромол, гексафосфамид) по схемам лечебных протоколов; 1.2. **лучевая терапия** в период резкого увеличения л/у, селезёнки (или спленэктомия);
2. **Борьба с иммунопатологическими цитопеническими состояниями и инфекционными осложнениями:** дезинтоксикационная и симптоматическая терапия, глюкокортикоиды, трансфузии эритроцитов.

**Эритремия** - доброкачественно текущее хроническое миелопролиферативное заболевание, морфологическим субстратом которого является лейкозная пролиферация всех трёх ростков кроветворения (красного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного), с преимущественным ростом красного ростка. Встречается редко. Причины не известны.

**Лечение.**

1. **Диета** с ограничением мяса.
2. **Кровопускания.** У лиц пожилого и старческого возраста за один раз удаляют не более 350 мл крови, проводят 1-2 раза в неделю, достигая снижения гематокрита до 45%, гемоглобина — до 140-150 г/л.
3. При эритремии с лейкоцитозом, тромбоцитозом, спленомегалией, при миелопролиферативных синдромах и неэффективности кровопускания — **цитостатики** (иминос, миелосан, миелобромол)
4. **Антикоагулянты** (гепарин), **деагреганты** (аспирин, курантил), **салуретики, антагонисты альдостерона, НПВС.**
- 5.

**Миеломная болезнь (плазмоцитома).**

**Лечение:**

1. **Цитостатики.** Применяется как монотерапия сарколизином, циклофосфаном, так и полихимиотерапия.
2. **Глюкокортикоидные гормоны** (преднизолон) в комбинации с цитостатиками. Необходим контроль за показателями лейкоцитов и тромбоцитов.
3. **Анаболические гормоны** (неробол, ретаболил) в сочетании с цитостатиками и глюкокортикоидными гормонами.
4. При синдроме повышенной вязкости крови больным с кровоточивостью и резкой гиперпротеинемией, но без тромбоцитопении, азотемии показан **плазмаферез** в комплексе с реополиглюкином.
5. При синдроме сдавления опухолью, угрозе патологического перелома, при упорных костных болях местно показана **лучевая терапия.**
6. При инфекционных осложнениях показаны **антибактериальные препараты** и **гамма-глобулин.**
7. В комплексной терапии применяют **трансфузии размороженных отмытых эритроцитов, тромбоцитоцентрат.**
8. При переломах — иммобилизация.
9. Всем больным необходимо назначение лечебной физкультуры.