

Особенности лечения заболеваний системы дыхания у лиц старшей возрастной группы

Возрастные изменения бронхолегочного аппарата имеют большое значение в развитии легочной патологии. Частота хронических заболеваний возрастает с пятого десятилетия жизни. Наиболее частыми заболеваниями с этого возраста являются БА, хронический бронхит, ХОБЛ, пневмония, рак бронхов.

Бронхиальная астма

Лечение проводится как в условиях стационара, так и в условиях поликлиники. 1. Немедикаментозное лечение: 1.1. гипоаллергенная диета. Рекомендуется исключить из рациона рыбу, жирное мясо — свинину, баранину. Птицу готовят, предварительно сняв с нее кожу. Предпочтение отдается молочно-растительным блюдам; 1.2. обязательно подбирается комплекс ЛФК.

2. Медикаментозное лечение: 2.1. бронхолитики пролонгированного действия, в частности, теопек, теотард. При их применении возможно усиление головокружения, увеличивается вероятность падений пациента(!), что требует обучения пациента, и тщательного наблюдения за ним со стороны среднего медперсонала;

2.2. стабилизаторы тучных клеток (интал, кетотифен);

2.3. доказано благоприятное воздействие антагонистов кальция, поэтому при сочетанной патологии они обязательно вводятся в лечебный комплекс;

2.4. Для предупреждения купирования эпизодов затрудненного дыхания, удушья или пароксизмов кашля рекомендуются ингаляции /3 -2агонистов короткого действия (салбутамол, вентолин).

В период обострения БА реком-ся перевод пациента на небулайзерное введение препаратов.

Терапия геронтов должна быть максимально щадящей, с учетом сопутствующей патологии. Препараты назначаются с оптимальным эффектом действия и наименьшей вероятностью побочных действий.

Рекомендуется преимущественно ингаляционный способ введения препаратов, для оптимизации доставки препаратов рекомендуют использовать ингаляторы «Легкое дыхание», спейсеры, небулайзеры.

(!) Пациента необходимо обучить элементам ухода за ротовой полостью, а также регулярно контролировать соблюдение рекомендаций врача.

(!) Необходимо лечить сопутствующую патологию(!). Оказывать пациентам психологическую поддержку.

2.5. из физиотерапевтических процедур рекомендуют УФО, электрофорез кальция, ингаляции гепарина, вилозена, электросон.

Пациенты, страдающие БА должны регулярно наблюдаться участковым терапевтом, пульмонологом.

Ограниченные возможности лечебных учреждений не позволяют в полной мере осуществлять доклиническую диагностику и первичную профилактику БА, а также долгосрочное, комплексное сугубо индивидуальное лечение пациента. Хочется надеяться, что со временем все это будет широко применяться в нашей медицине.

Хронический бронхит

1. Прекратить воздействие этиологического фактора, т. е. курения. Но в старческом возрасте это уже не имеет значения, поэтому нет смысла запрещать курение полностью, создавая дополнительный стресс подопечному(!).

2. Диетотерапия. Диета подбирается таким образом, чтобы снять симптомы интоксикации и восстановить поверхностное натяжение слизистой оболочки бронхов. В состав рациона включается достаточное количество теплой жидкости, а также жирная морская рыба и продукты моря.

3. ЛФК, дыхательная гимнастика.

4. Постуральный дренаж с массажем грудной клетки.

5. Медикаментозная терапия.

5.1. Прежде всего, необходимы препараты, улучшающие бронхиальную проходимость, это препараты группы теофиллина. Для геронтов необходимо назначать препараты продолжительного действия, они обладают меньшими побочными действиями и не привязывают пациента к квартире. Применяют также аэрозольные препараты, такие как атровент, сальбутамол. Для лучшей доставки препаратов, рекомендуются пространственные ингаляторы, спейсеры, небулайзеры.

5.1. Применяются отхаркивающие препараты, которые также способствуют восстановлению бронхиальной проходимости. Можно использовать отвары мать-мачехи, термопсиса, можжевельника, шишек хмеля. Из официальных препаратов рекомендую бромгексин, лазолван, амброксол, мукозольвин и др.

5.2. Антибиотики назначаются только при клинических признаках интоксикации, наличии гнойной мокроты(!). Назначают полусинтетические пенициллины, препараты тетрациклинового ряда, цефалоспорины.

5.3. Обязательно назначают иммунокорректоры, антиоксиданты.

5.4. При частых обострениях(3 и более в год), рекомендуется введение вакцин: бронховаксон или бронхомунал.

5.5. В тяжелых случаях назначают стероидные гормоны.

6. Немедикаментозные методы лечения; 6.1. ЛФК; ДГ (с акцентом на дых. упражнения с длительным выдохом); массаж грудной клетки, в том числе и с постуральным дренажем.

6.2. Физиотерапия, преимущественно не аппаратная: горчичники (через марлю, пропитанную растительным маслом), теплые ножные ванны, горячие обертывания по методике Залманова и др.

6.3. Фитотерапия.

6.4. Аэрозольная терапия чесноком.

6.5. Кислородотерапия. Но нужно помнить, что геронты не всегда хорошо переносят кислородотерапию(!).

Обострение хронического бронхита длится до 30 и более дней, поэтому после выписки из стационара, пациент должен получать амбулаторное лечение. Это фитотерапия, ингаляции чеснока, отхаркивающие травы, ЛФК, постуральный дренаж, массаж грудной клетки.

Пациенты нуждаются в регулярном наблюдении участкового терапевта до конца жизни, проведении профилактических мероприятий. Несоблюдение предписанного режима приводит к быстрому прогрессированию процесса, инвалидности и зависимости пациента(!).

В качестве **профилактики** рекомендуется 1) диспансерное наблюдение, 2) проведение профилактического лечения во второй половине сентября до начала ноября и во второй половине февраля до марта.

Необходимо гигиеническое воспитание населения, здоровый образ жизни. Отказ от курения, отказ от пребывания в обществе курящих людей, применение антиоксидантов, улучшение экологии жилья, при частых обострениях рекомендуется проведение вакцинопрофилактики, применяется бронховаксон, бронхомунал.

Хроническая обструктивная болезнь легких. (ХОБЛ)

- 1.Снижение влияния факторов риска.
- 2.Образовательная программа
- 3.Лечение ХОБЛ при стабильном состоянии.
- 4.Лечение обострения заболевания.

I. Снижение влияния факторов риска. Отказ от курения с помощью коротких или длительных программ лечения. Большое значение имеет оздоровление рабочего места и домашней обстановки. Пациенты из группы риска и имеющие заболевание должны избегать интенсивных нагрузок во время повышенного загрязнения воздуха.

*II.Образовательные программы .*Обучение должно проводиться в разных формах: консультации, домашние программы, программы легочной реабилитации. Обучение должно быть адаптировано к нуждам и окружению пациента. Существуют различные типы программ обучения: памятки, проведение семинаров, школы.

III.Лечение ХОБЛ при стабильном течении.

1)Прежде всего — это диетотерапия (см. хр.бронхит).
2) Оптимальная для пациента физическая нагрузка: ЛФК, ДГ (см. хр.бронхит), гимнастика по Стрельниковой.

3)Медикаментозная терапия проводится ступенчато в зависимости от состояния пациента. Цель – улучшение бронхиальной проводимости. Необходимо помнить, что *ни одно лекарственное средство не влияет на долгосрочное улучшение легочной функции(!)*. Центральное место в лечении занимают 3.1.бронходилататоры (холинолитики, б-адреномиметики и метилксантины). Применяются комбинация бронхолитиков, именно комбинированное применение препаратов дает наибольший эффект и снижает риск побочных явлений(!). Применение тиотропия бромида, сальмотерола, формотерола наиболее показано для лечения среднетяжелой и тяжелой ХОБЛ. Этой же группе пациентов показано назначение ингаляционных антихолинергических препаратов: ипратропий бромида(атровент), тиотропий бромида. Назначаются /3 2-агонистов длительного действия: сальмотерел, формотерел в сочетании с метилксантинами (продолжительными теофиллинами). Бронходилатирующий эффект их ниже, применяются они перорально или парентерально. Имеют ряд дополнительных эффектов: снижают легочную гипертензию, стимулируют центральную нервную систему, усиливают работу дыхательных мышц. В настоящее время они относятся к препаратам *второй очереди* и чаще назначаются пациентам, которые по какой-то причине не могут принимать ингаляционные препараты. Для применения этой группы препаратов в настоящее время широко используют спейсеры и небулайзеры.

3.2.Муколитики и или мукорегуляторы(при нарушении выделения мокроты).

3.3.При лечении обострений применяются антибактериальные препараты: амоксициклин (амоксиклав, аугментин) или макролиды; доксициклин; цефалоспорины; при неэффективности – фторхинолоны(ципрофлоксацин). (!)Назначение АБ показано только при наличии двух и более симптомов: усиление одышки, увеличение объема выделяемой мокроты, появления гнойной мокроты.

3.5.Длительное применение кортикостероидов не рекомендуется в связи с повышением риска нежелательных явлений. *Кортикостероиды предпочтительнее применять в виде аэрозолей.*

3.6.При тяжелой дыхательной недостаточности имеет значение длительная кислородотерапия (более 15 часов в сутки).

3.7.Физиотерапия (см. хр.бронхит).

3.8.Аэротерапия: прогулки на свежем воздухе с постепен-м удлинением маршрута.

3.9. Терапия сопутствующих заболеваний: сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца.

Профилактика. Первичная профилактика заключается, прежде всего, в оздоровлении окружающей среды: отказ от курения, удаление курящих из общественных мест. Регулярные профилактические осмотры населения для выявления предболезни. Вторичная профилактика — это регулярное профилактическое лечение пациентов ХОБЛ. С целью третичной профилактики во время эпидемических вспышек респираторных заболеваний рекомендуется проведение вакцинопрофилактики. *Вакцинопрофилактика проводится в октябре, ноябре ежегодно.* Для профилактики сезонных обострений можно применять гриппозную вакцину или пневмококковую вакцину. Для лиц старше 65 лет ревакцинация должна проводиться пневмококковой вакциной.

(!) Антибактериальные препараты не оказывают должного профилактического эффекта, а чаще дают побочные явления. (!) Ограниченному количеству пациентов рекомендуют применение муколитических препаратов, в частности, хорошим профилактическим действием обладает флуимуцил, имеющий еще и антиоксидантный эффект.

Современный уровень знаний не дает возможности излечения хронической обструктивной болезни легких. Современные методы лечения не способны предотвратить прогрессирование болезни, что требует большего внимания к этому заболеванию и формирования у населения желания быть здоровым. В формировании здорового образа жизни большое значение придается среднему медперсоналу.

Острая пневмония

Исходы пневмонии:

1. выздоровление с дефектом, полного восстановления не происходит;
2. переход в хроническое течение;
3. смерть в 33- 60% случаев.

Лечение зависит от этапа заболевания.

1. Не медикаментозное лечение: На период бактериальной агрессии пациенту необходимо

1.1. обеспечить постельный режим, с постепенным расширением его в зависимости от состояния пациента. Необходимо помнить, что длительный постельный режим может в дальнейшем привести к тромбозам(!), поэтому гимнастические упражнения должны проводиться методистом регулярно.

1.2. Диетотерапия также зависит от этапа развития заболевания: в стадии бактериальной агрессии рекомендуется диета № 13, малокалорийная, предусматривающая достаточное количество жидкости (2-2,5л/сутки), витаминов и минералов (овощные бульоны, соки, фрукты, фиточай); по мере улучшения состояния для стимуляции иммунитета и восполнения белка рекомендуется на короткое время диета № 11; в фазу клинического и морфологического восстановления рекомендуется диета с учетом сопутствующей патологии. *Медицинская сестра обязана организовать лечение диетой, привлекая родственников.*

1.3. Большое значение придается ЛФК, ДГ, массажу, так как постельный режим, назначаемый пациенту, может способствовать развитию осложнений.

2. Медикаментозное лечение. С первых дней назначают 2.1. антибиотики широкого спектра действия, так как чаще всего посева на микрофлору не проводятся. Антибиотики назначают короткими курсами, часто меняя их в зависимости от состояния пациента. Назначают полусинтетические пенициллины: ампициллин, амоксициллин, клаксациллин; макролиды — кларитромицин, рокситромицин, спирамицин; цефалоспорины — цефуросим, ципрофлоксацин. *В первые часы применения антибиотикотерапии возможно развитие инфекционно-токсического шока(!)*, что требует большого внимания со стороны среднего медработника (см. правила антибактериальной терапии у геронтов(!)).

2.2. Для профилактики ДВС назначают гепарин, свежзамороженную плазму, 1-2 гемотрансфузии в зависимости от степени тяжести заболевания.

2.3. Для снятия интоксикации назначают солевые растворы; 5-10% р-ры глюкозы под контролем диуреза.

2.4. Обязательно назначаются антиоксиданты, 2.5. геропротекторы.

2.6. Коррекция дренажной функции: при мучительном сухом кашле – кодеин, этилморфина гидрохлорид (дионид); для улучшения бронхиального дренажа – отхаркивающие и муколитические средства (ипекакуана, термопсис, алтей, 3% р-р калия йодида), протеолитические ферменты.

2.7. При бронхоспастическом синдроме: бронхоспазмолитические препараты (теофедрин, эфедрин).

2.8. По мере улучшения состояния назначают иммуностимуляторы.

2.9. Физиотерапия: банки локально над очагом воспаления, электрофорез йода, алоэ, кальция хлорида, дионида и натрия салицилата (при шуме трения плевры) и др.; аэрозольтерапия.

2.10. Ингаляции увлажненного кислорода (кислородные палатки, маски).

После выписки из стационара пациент должен получать общеукрепляющую терапию, в частности: фитотерапию; -ЛФК; аэрозольтерапия; при значительной астении рекомендуется 1-2 инъекции анаболических препаратов.

В течение года пациент должен наблюдаться участковым терапевтом с обязательным проведением профилактического лечения. (!) Медицинская сестра обязана регулярно приглашать пациента на профилактический осмотр, организовать амбулаторное профилактическое лечение. Она обязана проследить, чтобы пациент пришел на контрольную флюорографию.

Критерием снятия с учета пациента является контрольная флюорография.

Профилактика. В связи с тяжелым течением пневмоний, часто заканчивающихся инвалидностью, смертью рекомендуется проведение профилактических прививок против пневмонии, особенно, среди групп высокого риска. Для этой цели используется противогриппозная 23-валентная вакцина, пневмококковая вакцина.

Рак легкого, метастатические опухоли легких.

Паллиативное лечение (обезболивающие, седативные, нейролептики, деинтоксикация и др.) проводится с целью улучшения КЖ пациента и ослабления тягостных симптомов болезни. Уход за больным в неоперабельной стадии является главным, он предусматривает максимальное облегчение страданий, обеспечение его потребностей.

Советы медицинской сестры КАШЕЛЬ

Кашель — это рефлекторный защитный акт, очищающий дыхательные пути от раздражающих объектов, например, дым, химические вещества, духи, пыль, выхлопные газы, или излишняя слизь, образующаяся при воспалении дыхательных путей.

Наиболее часто кашель встречается при различных заболеваниях легочной системы. Развивающееся воспаление дыхательных путей приводит к образованию слизи, которая отхаркивается в виде мокроты. Сухой надсадный кашель чаще наблюдается при поражении мелких бронхов.

Для предупреждения развития кашля необходимо держаться подальше от курящих людей. Необходимо избегать длительного нахождения в задымленных, запыленных помещениях. Если вы курите, необходимо отказаться от этого пристрастия, так как сигаретный дым — причина формирования хронического бронхита, сопровождающегося длительным кашлем.

Для профилактики заболеваний легочной системы необходимо правильное питание. В рацион необходимо включать продукты, стимулирующие иммунитет. К таким продуктам можно отнести цитрусовые, овощи (редька, чеснок, морковь, облепиха, репа).

Важное значение имеет, регулярно проводимая, гимнастика.

При наличии мокроты не следует принимать медикаменты, подавляющие кашель, следует воспользоваться средствами, вызывающими разжижение и отделение мокроты. Если кашель сухой необходимы средства, снимающие раздражение слизистых оболочек дыхательных путей.

Жидкости. При всех видах кашля необходимо пить достаточно большое количество теплой жидкости, это может быть теплая минеральная вода, чай с черной смородиной, фруктовый сок. Не следует применять напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они вызывают обезвоживание организма.

Овощи. Многие овощи составляют основу традиционных средств от кашля.

◆ Приготовьте сок из репы и моркови. Этот сок обладает антисептическим действием.

◆ Антисептическим действием обладает сок черной редьки. Для его приготовления тщательно вымойте черную редьку. Срежьте верхушку и выдолбите часть сердцевины. В образовавшуюся полость поместите чайную ложку меда и дайте образоваться соку. Пейте сок по чайной ложке 4—5 раз в день.

◆ Отожмите через салфетку отваренный лук-порей. Выжатый сок смешайте с медом и принимайте по столовой ложке 3 раза в день.

◆ Порежьте сырую луковицу, полейте ее медом, дайте настояться в течение 12 часов. Принимайте по две чайных ложки каждые 2 часа.

◆ Пейте капустный сок или сделайте компресс из ошпаренных кипятком капустных листьев.

Фитотерапия. Некоторые травы помогают снять воспалительные явления в дыхательных путях, разжижают мокроту, стимулируют неспецифический иммунитет. Так средства, содержащие эхинацею, укрепляют иммунитет, а отвар из цветков черной бузины помогает против вирусных заболеваний.

◆ При кашле с мокротой принимайте чай из семян тимьяна, корня алтея, укропа.

◆ При сухом кашле попробуйте отвары из медуницы, багульника.

◆ Отвар грудного сбора.

АРОМАТЕРАПИЯ

Эфирные масла могут облегчить кашель при обострении хронического бронхита.

◆ Устройте себе паровую ингаляцию с помощью аппарата «Ромашка». Поместите несколько капель эвкалиптового или мятного масла в ингалятор и вдыхайте.

◆ Смочите носовой платок этими же маслами и вдыхайте их аромат

◆ Если кашель усиливается по ночам, смочите носовой платок этими же маслами и поместите под подушку, или поместите несколько капель масла в испаритель.

◆ Добавьте кедровое масло (3 капли), мятное (2 капли), масло чайного дерева на две чайных ложки лосьона для тела, не имеющего запаха, и втирайте смесь в кожу грудной клетки.

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ КАШЛЕ

◆ Гимнастика по методике Стрельниковой.

◆ Специальные восточные упражнения, которые могут укрепить ваш организм по мере повторения упражнений улучшается осанка, формируется правильное дыхание. Эти упражнения снижают напряжение мышц груди, живота, плечевых мышц, возникающих при кашле, помогают справиться со стрессом.

1. Встаньте свободно, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, голова в естественном положении.

2. Вытяните руки перед собой ладонями кверху, представьте, что вы держите на них большой мяч.

3. На вдохе медленно поднимите руки над головой ладонями вверх, выпрямите колени, посмотрите вверх.