

## Особенности течения заболеваний крови у лиц гериатрического возраста

Анемии – это большая группа заболеваний, характеризующихся снижением гемоглобина в единице объема крови, нередко сопровождаемое снижением числа эритроцитов.

Анемия – это наиболее частый синдром, встречающийся в гериатрии; частота ее увеличивается с возрастом, и после 85 лет встречается у 25-40% мужчин и 16-20% женщин. Анемия у геронтов часто провоцирует развитие психических и неврологических заболеваний, а также СН.

Развитие анемии в позднем возрасте в большинстве случаев обусловлено не возрастными изменениями кроветворной ткани, а обусловлено разнообразными патологическими процессами.

**Этиология:** - алиментарный фактор - (недостаточное поступление железа); - хр. кровопотери; - нарушение всасывания железа (прогрессирующая атрофия слизистой желудка и кишечника, энтериты, пострезекционные состояния); хр. инфекционные заболевания, воспалительные и токсико-аллергические процессы; -сочетанные факторы.

### Особенности клинической картины анемического синдрома:

- -высокая адаптация к низкому уровню Hg, особенно при В12 – дефицитной анемии;
- -часто первым признаком анемии является усиление проявлений ИБС (учащение приступов стенокардии, аритмии, появление (нарастание) симптомов СН);
- -на первом месте синдром гипоксии (общая слабость, утомляемость, потливость, головокружение, шум в ушах и голове);
- -в различной степени выражены трофические нарушения кожи, волос, ногтей; слизистых оболочек, мышц; мышечная слабость, нарушение мочеиспускания, недержание мочи при кашле и чихании;
- -извращение вкуса и обоняния;
- -синдромы гиповитаминоза, иммунодефицита, гипопроотеинемии; синдром «сочетанной анемии»;
- -изменения специфической симптоматики, характерной для каждой анемии (например: незначительная выраженность синдрома тканевого дефицита железа);
- -множественность сопутствующей патологии;
- -отсутствие явных кровотечений;
- -преобладание в клинике желудочных расстройств;
- -сочетание нескольких патогенетических вариантов анемии.

**Диагностика затруднена по причинам:** - нежелание пациента и медперсонала проводить полноценное обследование; -прием медикаментов, ухудшающих всасывание железа, витаминов; -необоснованное назначение вит.В12 при неврологической симптоматике. Необходим: тщательный диагностический поиск причин; диф.диагноз синдрома гипоксии и гипоксемии другой этиологии.

Железодефицитная анемия – наиболее частая форма в гериатрической практике; чаще встречается у мужчин (чаще возникают кровотечения).

В организме содержится примерно 4-4,5 г. железа ( 3 г. в эритроцитах, остальное – в органах и тканях). Суточная потеря Fe – примерно до 1-го грамма. Из мяса в организм человека поступает до 2,5 г. Fe, но всасывается только 10% (!).

Основные причины потери железа у геронтов: -кровотечения из ЖКТ; - дивертикулез кишечника; -зубные протезы(!); -поликистоз почек, МКБ, ХП, ХПН, хр. панкреатит, атрофия слизистой оболочки желудка или кишечника; -гипотиреоз; -развитие конкурентной микрофлоры, потребляющей Fe; -недостаток вит. С.

**Диагностика:** установление причины дефицита Fe требует тесного сотрудничества с пациентом; значения реакции Грегерсена мало, т.к. у геронтов чаще бывает ложноположительной(!); общ. ан. крови; б/х ан. крови; рентгенологическое исследование ЖКТ; ректороманоскопия; ФГДС.

**Клиническая картина** складывается из ряда симптомов: *гипоксического; сидеропенического; анемического; иммунодефицитного.*

**В 12-дефицитная анемия** - часто встречается у геронтов, особенно в сочетании с болезнями щитовидной железы и сахарным диабетом.

**Клиническая картина** связана с поражением кроветворной системы, ЖКТ и нервной системы: 1) *анемический синдром*; 2) *синдром диспепсии*, стойкая ахлоргидрия и глоссит, симптоматика гастрита; нарушение вибрационной чувствительности; спастическая походка; нарушения психики (нарушения памяти, галлюцинации)); 3) *поражение НС* – фуникулярный миелоз (парестезии, периферическая полинейропатия; атаксия; нарушение вибрационной чувствительности; спастическая походка; нарушения функции тазовых органов; нарушения психики (нарушения памяти, галлюцинации)).

**Критерии В 12-дефицитной анемии**: высокий цветной показатель (выше 1,1), анизо- и пойкилоцитоз, тельца Жолли и кольца Кебота, лейко- и цитопения; гиперсегментация ядер нейтрофилов.

**Лейкозы** – опухоли кроветворной ткани, первично поражающие костный мозг.

**Этиология:** - наследственная предрасположенность; аутоиммунные нарушения.

**Особенности:**- преимущественно доброкачественное течение и медленное, годами, развитие заболевания.

**Стадии болезни:** *начальная; развёрнутая; терминальная.*

В гериатрической практике **чаще встречаются хронические лейкозы:**  
- **хр. лимфолейкоз** (кожный, миелопролиферативный, гематологический синдромы);

- **хр. миелолейкоз** (миелопролиферативный; астенизации; болевой (оссалгии, миалгии); геморрагический синдромы);

- **миеломная болезнь (плазмоцитомы)** (костный синдром: триада Калера(боли, опухоли, переломы); синдром белковой патологии; почечный и гематологический синдромы).

**Хронический лимфолейкоз** - *хр. пролиферативное заболевание, морфологическим субстратом которого является повышенное образование морфологически зрелых В-, Т-, О- лимфоцитов вследствие увеличения срока их жизни.*

Постепенное накопление лимфоцитов приводит к увеличению лимфоцитарных органов (лимфоузлов, селезёнки) и угнетению нормальных ростков крови. Старые лимфоциты функционально неполноценны (уменьшено содержание иммуноглобулинов, нарушено взаимодействия Т- и В- лимфоцитов). В итоге нарушается процесс образования антител (инфекционные осложнения), появляются аутоантитела к собственным клеткам крови.

**Клиническая картина. Клинические формы:** доброкачественная, прогрессирующая, костномозговая, опухолевая, спленомегалическая, пролимфоцитарная, «волосатокле-точный» лейкоз, Т- форма.

**Жалобы в развёрнутую стадию:** кожный зуд; лихорадка, потливость; боли в костях, суставах; симптомы пролиферативного синдрома (похудание, одышка, кашель, часто поносы).

**Осложнения:** - гнойно-воспалительные (пневмония);

- аутоиммунные (аутоиммунная гемолитическая анемия).

**Объективно:** - *бледность* с желтушным оттенком; - *похудание*;

- **кожные поражения** – частое проявление атипичных форм: (кожные геморрагии, инфильтративные, ulcerированные узелки и папулы; генерализованная эритродермия; аллергические и токсические папулёзные высыпания; зуд; эритема, экзема);  
- **увеличение лимфоузлов, миндалин, сплено-, гепатомегалия** (реже).  
**Лабораторно-инструментальные данные:** общ. ан. крови: лейкоцитоз, лимфоцитоз, тельца Боткина-Гумпрехта, единичные лимфобласты; анемия; в поздних стадиях тромбоцитопения;  
костный мозг: увеличение лимфоцитов более чем на 30%.

**Терминальная стадия:** быстрое прогрессирование пролиферативного, геморрагического, гематологического синдрома (бластный криз); костно - болевого синдрома.

**Хронический миелолейкоз** - *хр. пролиферативное заболевание, морфологическим субстратом которого является повышенное образование гранулоцитов.*  
Встречается реже.

**Особенности:** доброкачественное течение и медленное, годами, развитие заболевания.  
**В развёрнутой стадии:** спленомегалия, гепатомегалия. Общ. ан. крови: лейкоцитоз, сдвиг нейтрофильных гранулоцитов до метамиелоцитов и единичных миелобластов; в дальнейшем – анемия и тромбоцитопения. В костном мозге: увеличение гранулоцитарного ростка с преобладанием зрелых форм.

**Терминальная стадия:** быстрое прогрессирование пролиферативного (саркомное разрастание в лимфоидных тканях), геморрагического, гематологического синдрома (бластный криз, резкая базофилия или эозинофилия); костно- болевого синдрома; лихорадка; **жалобы:** потливость, истощение, тяжесть и боль в области печени и селезёнки; костные боли; боли в области сердца и аритмию. **Осложнения:** -  
**геморрагический диатез** (геморрагии, тромбоз); -  
**гнойно-воспалительные** (пневмонии, плевриты, бронхиты, гнойные поражения кожи и подкожной клетчатки); -  
**мочекислый диатез** (гиперурикемия в результате распада гранулоцитов).

**Эритремия** - *доброкачественно текущее хроническое миелолипролиферативное заболевание, морфологическим субстратом которого является лейкозная пролиферация всех трёх ростков кроветворения (красного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного), с преимущественным ростом красного ростка.* Встречается редко. Причины не известны.

**Клиническая картина** проявляется 2 синдромами: **1.**  
**Плеторический синдром** (плетора – полнокровие): жалобы на головные боли, головокружение; нарушение зрения; боли в области сердца; кожный зуд; эритромелалгии (внезапная гиперимия с синюшным оттенком кожи пальцев рук, с резкими болями, жжением) онемение и зябкость конечностей.  
**Объективно:** эритроцианоз; повышенное АД; кровоточивость, развитие тромбозов; часто отёки голеней.

**Осложнения:** острый ИМ, инсульт, нарушения зрения, тромбоз печёночных артерий.  
**2. Миелолипролиферативный синдром:** жалобы на слабость, головные боли, боли в костях, чувство тяжести (боли) в левом подреберье.  
**Объективно:** признаки эритромелалгии («кроличьи глаза» (инъецированные сосуды конъюнктивы)); кровоточивость, развитие тромбозов; часто отёки кончиков пальцев, стоп, голеней с локализованной гиперемией); сплено-, гепатомегалия.  
**Общ. ан. крови:** эритроцитоз, тромбоцитоз, лейкоцитоз со сдвигом влево; панцитоз; умеренное повышение СОЭ; повышение гематокрита и вязкости крови.  
**Костный мозг:** тотальная гиперплазия трёх ростков с преобладанием эритропоэза.  
**Осложнения:** 1. сосудистые тромбозы. **2.**

геморрагический синдром (кровотечения)

3.

эндогенные урикемия и урикурия (симптомы МКБ и подагрического артрита)

**Диф.диагноз с эритроцитозом: относительным** (при обезвоживании(понос, рвота, усиленное потоотделение, ожоговая болезнь, сахарный диабет, сердечная недостаточность) – возникают остро, временного характера; возрастает количество эритроцитов в единице объема без увеличения массы циркулирующих эритроцитов, а также повышаются гемоглобин и гематокрит в результате уменьшения объема циркулирующей плазмы.

В старческом возрасте нередко развивается и **абсолютный эритроцитоз**:

1. Гипоксический эритроцитоз (различные заболевания бронхолегочного аппарата, сердца, заболевания ЦНС, высотная болезнь и др.).

2. Опухолевый эритроцитоз (гипернефроидный рак, гемангиобла-стома мозжечка, гепатома, опухоли желез внутренней секреции).

3. Локальная гипоксия почек (гидронефроз, стеноз почечных артерий).

### **Миеломная болезнь (плазмоцитома).**

В основе развития основных клинических и лабораторных признаков, а также осложнений плазмоцитомы лежат **миеломно-клеточная инфильтрация костного мозга и синтез опухолевыми клетками паратпротеина.**

**Классификация: 1. Множественная.**

— Множественноузловая.

— Диффузная.

— Диффузно-узловая.

**2. Солитарная.**

— Костная.

— Внекостная.

**Клиническая картина.**

В большинстве случаев периоду выраженной клинической картины предшествует **многолетний бессимптомный доклинический период.**

Первыми проявлениями болезни могут быть *астения*, похудание, ухудшение аппетита, пневмония, боли в костях, их спонтанные переломы, «случайное» обнаружение ускорения СОЭ и белка в моче.

Клинически выделяют основные синдромы:

1. **Костный синдром** (триада Калера: боли, опухоли, переломы). У лиц пожилого возраста боли в позвоночнике длительное время расцениваются как проявление остеохондроза. В результате переломов тела позвонков уплощаются и приобретают форму «рыбьих» позвонков, в результате чего рост больных уменьшается, возникают деформации позвоночника и грудной клетки. Деформация позвоночника приводит к сдавлению костного мозга и развитию корешковых болей, параличей, нарушению функции тазовых органов. При диффузной форме наблюдается остеопороз костей.

Рентгенологическая картина черепа: остеолитические очаги представляются как «выеденные молю».

2. **Синдром белковой патологии:** сухость кожных покровов, нарушение периферического кровотока в конечностях (синдром Рейно, <sup>ак</sup>Рогангрены, кровоточивость слизистых оболочек).

Лабораторные данные:

Глубокие нарушения белкового обмена проявляются гиперпротеинемией, гиперглобулинемией, положительными осадочными реакциями, паратпротеином в сыворотке, повышением кальция, повышением вязкости крови, ускорением СОЭ до 60-80 мм/ч.

3. **Почечный синдром:** упорная протеинурия, гиалиновые цилиндры, реже зернистые. При электрофорезе мочи выявляется белок Бенс-Джонса.

Для миеломной нефропатии не характерны гипертензия, гематурия гиперхолестеринемия, отеки. Постепенно развивается почечная недостаточность.

4. **Гематологический синдром:** нормохромная анемия, количество лейкоцитов в норме или умеренно снижено, относительный лимфоцитоз или нейтрофилез со сдвигом влево и появлением молодых элементов гранулоцитарного ряда, в терминальном периоде развивается тромбоцитопения.

В костном мозге — инфильтрация миеломными клетками, нормальные ростки кроветворения угнетены.