

## **Особенности течения заболеваний мочевыделительной системы у лиц старшей возрастной группы.**

Частота пиелонефритов у геронтов составляет 15% от заболеваемости, в то время как в зрелом возрасте хронический пиелонефрит встречается в 5—7% случаев. Рост заболеваемости пиелонефритом определяется возрастной перестройкой организма и большей вероятностью инфицирования МВП.

### Основные причины инфицирования МВП у геронтов:

—циститы, кольпиты, простатит, бронхолегочная патология, зубные гранулемы, гнойничковые заболевания кожи;

—в процессе старения отмечается уменьшение числа нефронов, разрастание соединительной ткани, снижение содержания К, витаминов в клетках и тканях, нарастающая гипоксия почечной ткани.

Все это приводит к повышенной чувствительности ткани почек к приему медикаментов, особенно анальгина, на фоне которого иногда формируются почечные абсцессы, инфекционным заболеваниям; —большое значение в развитии пиелонефрита имеет возрастное понижение функции мочевыводящих путей. Потеря эластичности, расширение мочеточников, склонность к рефлюксам — изменяет эвакуаторную деятельность, способствуя развитию патологии;

—возрастные изменения усугубляются заболеваниями, приводящими к перегибу, обтурации мочевыводящих путей — это опухоли кишечника и гениталий, деформация скелета, каловые камни;

—имеет значение снижение механизмов защиты, как общей, так и местной;

-- большую роль в развитии патологии МВС играет атеросклероз и сахарный диабет.

В старости, особенно у мужчин, чаще встречается односторонний вторичный пиелонефрит.

### **Хронический пиелонефрит**

**Пиелонефрит — неспецифическое бактериальное заболевание почечных лоханок и чашечек с последующим вовлечением в процесс интерстиция почек, кровеносных сосудов и клубочков, приводящее в итоге к развитию хронической почечной недостаточности.**

Заболевание чаще встречается у лиц старшей возрастной группы. Пиелонефрит в этом возрасте является следствием либо острого процесса, либо следствием возрастных изменений МВС.

**Клиническая картина** заболевания отличается латентным течением, и длительное время не привлекает внимание ни самого пациента, ни медицинского работника.

### Особенности течения ХП у геронтов:

—нет типичного чередования периодов обострения и ремиссии;

—заболевание течет монотонно, и, порой, только стойкая АГ может навести на мысль о хроническом поражении почек;

—АГ на фоне ХП протекает злокачественно и сопровождается развитием анемии;

—отеки наблюдаются редко, менее выражены и часто просматриваются медперсоналом;

—лихорадка не выражена, изредка наблюдается повышение температуры до субфебрильных цифр даже при тяжелом течении заболевания;

—чаще на первый план выступают признаки неадекватного поведения пациента — спутанность, порой необоснованная эйфория.

**Диагностика** затруднена. Большое значение в диагностике имеет настороженность медицинского персонала, а также использование адекватных методов исследования. К ним относятся:

—исследование мочи — выявление в осадке лейкоцитов, бактериального числа;

—проба Нечипоренко; —проба Зимницкого;

—для изучения азотвыделительной функции почек применяется проба Реберга;

—проводится реонефрография; —сканирование почек;

—УЗД, КТМ;—экскреторная урография;—цистоскопия проводится только в стационарных условиях.

Прогноз заболевания серьезный. Атипичное течение, несвоевременная диагностика, раннее присоединение анемии, ХПН — приводит пациента к гибели. Только настороженность медицинского работника и качественное лечение может несколько удлинить жизнь пациента.

### **Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ).**

**Доброкачественная гиперплазия предстательной железы** — это заболевание, характеризующееся разрастанием парауретральных желез, приводящее к нарушению мочеиспускания с возможным развитием ХПН.

Это заболевание МВС, наиболее часто встречающееся у мужчин. Уже после 40 лет 40% мужчин страдает этой патологией, а к 80 г. у 90% мужчин выявляют это заболевание.

**Актуальность заболевания** заключается в том, что *высок риск летальных исходов, в основе которых лежат ХПН, сепсис, осложнения от хирургических вмешательств. Кроме того, заболевание резко снижает качество жизни пациента.*

**Причина заболевания** до конца не изучена, считается, что в основе заболевания лежит нарушение гормонального баланса возрастного характера, приводящее к разрастанию парауретральных желез, протоки которых открываются на задней стенке простатического отдела уретры.

**Клиника заболевания** характеризуется *разного вида и степени нарушения мочеиспускания.* Пациенты отмечают учащение мочеиспускания как днем так ночью, удлинение акта мочеиспускания, и вялую струю мочи. Заболевание протекает в три стадии.

1. Стадия компенсации, в этой стадии мышца, сокращающая мочевой пузырь, в состоянии преодолеть сопротивление, возникающее в уретре. Пациенты отмечают затруднение в начале мочеиспускания особенно по утрам, акт мочеиспускания удлинен, струя мочи вялая, мочевой пузырь опорожняется полностью.

2. Стадия умеренной декомпенсации характеризуется учащенным мочеиспусканием, особенно в ночное время. Вся симптоматика нарастает, присоединяется чувство неудовлетворенности после акта мочеиспускания, так как нарастает слабость детрузора, в результате чего часть мочи остается в мочевом пузыре, а это повышает риск развития пиелонефрита, ХПН. Периодически появляются эпизоды недержания мочи.

3. Стадия тяжелой декомпенсации, мочеиспускание учащено, каждые 10 мин. возникают позывы на мочеиспускание. Появляется недержание мочи. Возможно развитие о.задержки мочи или парадоксальной ишурии. Резко ухудшается состояние пациента и прогноз. Возрастает риск развития ХПН.

**Диагноз** основывается на данных: —анамнеза: —пальцевого исследования через прямую кишку; —проводится определение простатспецифического антигена; —проводится УЗ И, КТМ; —при подозрении на рак забирается материал на биопсию.

### **Недержание мочи (инконтиненция)**

Эта проблема затрагивает от 15 до 30% геронтов, проживающих в домашних условиях и до 50% пациентов, проживающих в условиях учреждений постоянного ухода. Проведенный опрос населения показал, что 38,6% женщин отмечают симптомы инконтиненции при напряжении. Из них 20% отмечают регулярный характер симптоматики, а за помощью обращаются лишь 4,1%.

**Этиология и патогенез.** Недержание мочи предрасполагает к развитию воспалительных процессов кожи промежности, инфекциям МВС, сопровождается самоизоляцией пациентов, социальной изоляцией, развитием депрессии.

Возрастные изменения мочевыделительной системы способствуют развитию этого состояния, как у мужчин, так и у женщин. С возрастом выделение мочи в основном происходит в ночное время, даже при отсутствии патологии со стороны МВС. Нормальным для геронта считается одно, два мочеиспускания ночью.

**Клинические формы.** Выделяют **истинное недержание мочи** и **транзиторное недержание мочи**. Примерно половина пациентов страдает транзиторным недержанием мочи, в основе которого лежат нарушение сознания, неврологические заболевания, прием диуретиков, седативных препаратов, атрофический вагинит у женщин, повышенный диурез вследствие приема большого количества жидкости, СД, снижение физической активности вследствие заболеваний суставов, последствий травм, ХСН. Все эти причины обратимы, и при их устранении происходит успешное купирование недержания мочи.

В тех случаях, *когда причины транзиторного недержания мочи устранены, а явления сохраняются, необходимо тщательное урологическое исследование.* Наиболее частой причиной истинного недержания мочи у лиц обоего пола является повышенная спонтанная активность детрузора. У женщин возможно развитие стрессового недержания мочи, обусловленного слабостью мышц тазового дна или нестабильностью уретры, когда сфинктер непроизвольно расслабляется при отсутствии сокращений детрузора.

В **диагностике** недержания мочи имеет значение сбор анамнеза, составление дневника спонтанных мочеиспусканий в течение 48—72 часов, в котором фиксируется частота мочеиспусканий, количество выделяемой мочи, количество ночных мочеиспусканий, наличие поллакиурии, эпизоды недержания

ния мочи. Монотонно малые объемы свидетельствуют о повышенной возбудимости детрузора, а монотонно большие — о снижении возбудимости. Для нормальной возбудимости детрузора характерны разные — и малые (50—100 мл), и большие (150—200мл) объемы. Важным преимуществом этого метода является его объективность и физиологичность, поскольку измерение происходит в обычных, естественных для пациента, условиях.

Урофлоуметрия — метод прямой регистрации динамики объемной скорости потока мочи во времени.

Цистометрия — измерение и непрерывная регистрация изменений внутрипузырного давления по мере наполнения мочевого пузыря и при мочеиспускании. Для этого используется двухпросветный измерительный катетер.

УЗД дополняет картину исследований.

## **Хроническая почечная недостаточность. ХПН**

**ХПН — патологическое состояние, обусловленное необратимой потерей массы функционирующих нефронов и других тканей почки.**

ХПН сопровождается часто другие заболевания геронтов и может проявиться неожиданно как для пациента, так и для врача.

**Этиология.** У геронтов причиной ХПН может быть хронический пиелонефрит, простатит, уролитиаз, СД, туберкулез почек, ДГПЖ и др.

В основе **патогенеза** ХПН лежат три фактора:

1. Снижение объема, циркулирующей через почечные сосуды, крови;
2. Снижение перфузии крови через нефроны;
3. Замещение почечной структуры соединительной тканью.

ХПН у пожилых людей принимает неизбежно прогрессирующее течение, даже при отсутствии обострений заболевания, вызвавшего развитие этого состояния.

**Клинические проявления** ХПН разнообразны. Среди основных синдромов можно выделить:

- гипергидратацию;
- гипонатриемию;
- синдром уремической интоксикации;
- уремический перикардит, миокардит;
- уремическая гастроэнтеропатия;
- анемия и др.
- гиперкалиемию и гипокалиемию;
- системный кожный зуд;
- энцефалопатию;
- уремический плеврит, пневмонит;
- нарушение свертывающей системы крови;

**В диагностике** имеет значение настороженность медработника, умение анализировать такие симптомы, как никтурия, снижение удельного веса мочи.

В классификации по клиническим признакам выделяют три стадии в развитии этого состояния.

**I. Стадия начальных проявлений.** У пациентов отмечается никтурия, незначительная слабость, снижение веса, повышение АД. Часто ни сами пациенты, ни медицинские работники не обращают внимание на эти симптомы. В анализе крови выявляется умеренная анемия. Повышается содержание креатинина, все эти признаки порой расцениваются как признаки интеркуррентных инфекций.

**II. Развернутая клиническая картина.** В это время у пациентов отмечается нарастание слабости, резкое снижение работоспособности, нарушение сна, резкое снижение аппетита. Снижается масса тела, АД не поддается коррекции, появляется подташнивание, рвота. В анализе крови еще более снижается содержание гемоглобина (80 — 90г/л), нарастает уровень креатинина, К, Na. Диурез снижается до 1 л, усиливается никтурия.

**III. Терминальная.** Быстро нарастает гипергидратация, уремическая интоксикация, анемия, развивается ДВС и другие симптомы. Без адекватной терапии очень быстро наступает смерть.

**Чаще всего первая и вторая стадия заболевания просматриваются врачами.**