

Особенности течения заболеваний опорно-двигательной системы у лиц старшей возрастной группы

Патология костей и суставов относится к числу наиболее частых болезней человека. Эти болезни являются ведущей причиной нетрудоспособности, часто имеют хроническое течение и сопровождаются постоянными и периодически усиливающимися болями. Они ограничивают физическую активность, ухудшая экономическое и психологическое положение в семье. Патология костей и суставов относится к заболеваниям, которые оказывают неблагоприятное воздействие на общество, вследствие потери раб.силы и огромных затрат на уход, обеспечение и соц. поддержку пациентов.

Основные направления по преодолению социальных и экономических проблем, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: 1.повышение информированности населения. 2.обучение населения. 3.обучение врачей. 4.поддержку пациентов с патологией костей и суставов. 5.расширение исследований.

Деформирующий остеоартроз

ДОА — это заболевание суставов, в основе которого лежит первичная дегенерация и деструкция суставного хряща с последующей пролиферацией костной ткани и развитием вторичного синовита.

ДОА занимает большое место среди заболеваний костно-мышечной системы и составляет от 3 до 10%. Среди геронтов 85% страдают ДОА, причем среди женщин заболевание встречается чаще, соотношение мужчин и женщин 1:3. Остеартроз значительно ухудшает качество жизни пациентов, приводя к инвалидности, и представляет серьезную социально-экономическую проблему. Это заболевание рассматривается как «заболевание накопления» в пожилом и старческом возрасте. **Развитию остеоартроза способствуют возрастные изменения опорно-двигательного аппарата:** 1.Потеря костной массы. 2.Изменение рельефа суставных поверхностей. 3.Субхондральный склероз гиалинового хряща. 4.Сужение суставной щели. 5.Истончение суставного хряща. 6.Истончение суставной сумки. 7.Уменьшение мышечной массы.

Возрастные изменения в костно-мышечной системе начинаются рано, продолжаются длительно и определяется как уникальный биологический активный процесс.

При остеоартрозе патологический процесс локализуется не только в гиалиновом хряще, но и в синовиальной оболочке, суставной капсуле, внутрисуставных связках и околосуставных мышцах. Все это приводит к развитию в той или иной степени рецидивирующего синовита, дегенерции хряща, костному ремоделированию, склерозу суставной капсулы, дегенерации менисков, периапарткулярной мышечной атрофии.

Причина заболевания точно не выяснена. *Способствуют развитию заболевания факторы:* 1.Механическое повреждение хряща в процессе жизни. 2.Генетические нарушения. 3.Нарушения развития хряща в детстве. 4.Метаболические нарушения. 5.Возраст. 6.Пол — у женщин с избыточной массой тела это заболевание встречается чаще. 7.Физические нагрузки — работа с опорой на колени, ходьба по лестнице, подъем тяжестей. 8.Инфекции суставов. 9.Эндокринные нарушения. 10.Нервно-трофические нарушения.

В патогенезе заболевания выделяют IV этапа.

Хрящевая ткань состоит из хондроцитов и матрикса. В состав матрикса входят протеогликаны и коллагеновые волокна.

На I этапе в развитии заболевания отмечаются нарушения метаболические, снижается синтез протеогликанов хондроцитами, что приводит к нарушению связывания межклеточной жидкости.

На II этапе идет разволокнение коллагеновых волокон за счет проникновения в коллагеновые волокна межклеточной жидкости и выпадению из разрушенных волокон металлопротеиназы, а также происходит повышение синтеза простагландина E2.

На III этапе, металлопротеиназы, выпавшие из разрушенных коллагеновых волокон, продолжают разрушать оставшийся хрящ, продукты распада хряща вызывают реакцию со стороны суставной сумки, приводящую к фиброзу ее.

На IV этапе в процесс вовлекаются сухожилия и окружающие мышцы.

Все происходящие изменения приводят к нарушению кровообращения в окружающих тканях, из-за чего нарушается питание всех тканей сустава. Развивается сдавливание болевых рецепторов. Продукты распада хряща разрезают синовиальную оболочку суставной сумки, что приводит к развитию синовита. Затем в процесс вовлекается костная ткань, в ней развиваются кистозные образования, идет пролиферация костной ткани.

КЛИНИКА: Заболевание развивается незаметно. Поражаются в основном нагрузочные суставы позвоночника, крупные суставы нижних конечностей, дистальные суставы кистей рук и стоп.

Основными клиническими проявлениями ДОА являются боль и деформация суставов. Боли в пораженных суставах носят неоднородный характер, причины возникновения болей разнообразны. Боли могут быть незначительны, связанные с физической нагрузкой, могут усиливаться к вечеру, отмечается хруст в суставах. **Типы болей при ОА:**

♦ механические боли - под влиянием физической нагрузки и стихают в течение ночи;

- ◆ непрерывные ночные боли, чаще в первой половине ночи, связаны с венозным стазом и повышением внутрисуставного давления;
- ◆ стартовые боли кратковременные боли, возникающие после периода покоя и проходящие через 15—20 мин от начала движения;
- ◆ постоянные боли, обусловленные рефлекторным спазмом близлежащих мышц, а также реактивным синовитом.

Для синовита характерны припухлость сустава, повышение местной t.

Реактивный синовит сопровождается болезненным спазмом мышц. При явно выраженном процессе пациенты жалуются на быструю мышечную утомляемость. Возможно появление полной блокады сустава. *Характерной особенностью этого заболевания является то, что общее состояние человека страдает мало.*

Диагноз устанавливают на основании анамнеза, клинических и рентгенологических данных.

Анализ крови здесь не имеет существенного значения и применяется с целью дифференциации от других заболеваний. В биохимическом анализе крови также не выявляют каких либо специфических данных. Рентгенологические изменения имеют три степени выраженности.

I. Незначительное сужение суставной щели и небольшие краевые остеофиты.

II. Выраженное сужение суставной щели, узурация гиалинового хряща. Субхондральный склероз, остеопороз диафизов, значительные остеофиты.

III. Полное отсутствие суставной щели, деформация суставной поверхности. Обширные краевые остеофиты, кальциноз суставных капсул, кальцинаты в окружающих тканях.

Рентгенологические признаки не всегда соответствуют клинической картине. Помимо рентгенологического исследования в настоящее время большое значение имеет артроскопия, позволяющая детально изучить поверхность морфологию хряща и уточнить диагноз с помощью прицельной биопсии.

Помимо того, с помощью артроскопии возможно проведение лечебного воздействия на хрящ: пересадка хряща на участки обнаженной субхондральной пластинки, промывание суставной сумки, введение лекарственных препаратов и оперативные вмешательства, после которых пациент уже через 2 часа может идти домой, замещение внутрисуставной жидкости на искусственную. В настоящее время разработана искусственная внутрисуставная жидкость «Ноолтрас», содержащая ионы серебра.

Магнитно-резонансная томография — один из самых современных методов исследования, позволяет изучить не только структуру хряща, но и различные отклонения в обмене веществ.

Выделяют несколько клинических форм остеоартрита.

Коксартрит — наиболее тяжелая форма остеоартрита, быстро приводит к инвалидности пациента. Чаще страдают женщины, у мужчин заболевание развивается после 50 лет. Причиной в 58% случаев является травма. Проявляется заболевание болью в тазобедренном суставе, болью в паховой области, в ягодице. Сначала боли носят переменный характер, затем становятся постоянными, особенно при опоре на пораженную конечность. В начале заболевания отмечается ограничение ротации бедра внутри, затем наружу, затем нарушается сгибание в тазобедренном суставе. Изменяется походка. При двустороннем поражении отмечается утиная походка. Постепенно развивается атрофия мышц бедра, ягодиц.

Гонартрит — поражение коленных суставов по частоте стоит на 2 месте. Протекает благоприятно, к инвалидности приводит редко. Проявляется болью с внутренней стороны бедра при ходьбе по лестнице, при долгом стоянии с опорой на пораженную конечность. Затем присоединяется хруст, ограничение движений в суставе. Постепенно развивающаяся деформация сустава, приводит к атрофии мышц голени, бедра. Сам сустав приобретает шаровидную форму.

В тяжелых случаях развивается сгибательная контрактура, девиация голени O или X образная. Иногда развивается боковая подвижность суставов, приводящая к нестабильности его, что способствует неустойчивости пациента и падениям.

Геберденовские узелки чаще встречается у женщин, носит наследственный характер. Развивается в менопаузе. Вначале поражается I и II пальцы кисти, затем возможно вовлечение остальных пальцев и суставов. Заболевание протекает благоприятно, вызывая у женщин косметический дискомфорт.

Остеоартрит I плюсневого сустава часто встречается в пожилом возрасте. В основе заболевания лежат травмы. При развитии заболевания отличается боль при ходьбе, ограничивающая подвижность пациента. Затем происходит смещение пальца в наружную сторону, что приводит к деформации стопы, еще более ограничивает подвижность. У пациентов возникает необходимость в подборе обуви.

У геронтов часто наблюдается генерализованная форма остеоартроза, такая как деформирующий полиостеоартроз. **Характерные особенности:**

1. Одновременное симметричное поражение нескольких суставов.
2. Быстрое распространение процесса.
3. Раннее возникновение реактивного синовита.

Наиболее тяжелой формой является эрозивный остеоартроз. Характерные признаки:

1. Быстрое развитие костной деструкции
2. Частые рецидивы синовита, сопровождающиеся сильными болями и лихорадкой.
3. Изменения синовиальной жидкости.

Заболевание протекает очень быстро, тяжело, приводит к полной обездвиженности пациентов.

Варианты течения остеоартритов:

1. Медленно прогрессирующее течение встречается наиболее часто.
2. Быстро прогрессирующее течение с выраженной деформацией суставов, приводящее к развитию функциональной недостаточности в течении 1,5—2 месяцев встречается редко.
3. Стабильная форма.

Многообразие форм остеоартроза и высокая частота сопутствующей патологии диктуют необходимость учитывать их при выработке тактики лечения ДОА, т. е. предполагается разработка принципов индивидуального подхода в лечении больных с коррекцией общей терапии.

Остеопороз

Остеопороз — это заболевание, характеризующееся потерей костной массы, с нарушением ее архитектоники, [приводящее к повышенной хрупкости костной ткани.

Остеопороз является одной из причин страданий, инактивности, снижения качества жизни и безвременной] смерти пожилых людей. В настоящее время остеопороз представляет не только медицинскую, но и социально — экономическую проблему. За рубежом ОП приобрел характер «тихой эпидемии», причиной которой является старение населения. В США подсчитали, что для лечения остеопоротических переломов затрачивается от 14 до 15 миллиардов долларов в год. Самые большие затраты наблюдаются при лечении переломов бедра.

В развитых странах разрабатываются мероприятия направленные на профилактику, раннюю диагностику и качественное лечение остеопороза. В России медицинские работники мало осведомлены о данной патологии и в основном считают ее связанной со старостью. Отстают также и научные разработки в данной области.

Патогенез. В основе заболевания лежит вымывание из костной ткани солей кальция, магния, фосфора и других микро-элементов. В человеческом организме содержится примерно 1000г. кальция, из них 99% содержится в костной ткани и 1% содержится в экстрацеллюлярной жидкости: Нормальная масса кости может быть достигнута и сохранена рациональным питанием и адекватной физической нагрузкой, включением в рацион добавок кальция, отказом от пищевых пристрастий, курения. Главным фактором, стимулирующим всасывание кальция в тонком кишечнике, является активный метаболит вит.Д — кальцитриол. В его отсутствие только 10% кальция из кишечника усваиваются. Большое значение имеет также эстрогены и паратиреоидный гормон. В процессе жизни в костной ткани постоянно идет процесс разрушения и создания новой ткани. Важнейшими регуляторами минерального состава костной ткани является кальцитонин (гормон щитовидной железы), витамин Д и эстрогены.

Риск развития остеопороза выше у женщин. У1/3 женщин после 50 лет возникают переломы даже при незначительной нагрузке. Объясняется это тем, что костная ткань женщины значительно слабее, чем у мужчины. Причем, у худощавых женщин переломы встречаются чаще. Известно, что мужчины имеют КМ по сравнению с женщинами на 30% больше. После 35 лет у женщин наблюдается ежегодная потеря костной массы на 1%. После наступления менопаузы первые 2 года женщины теряют 8% КМ, затем ежегодная потеря составляет 1,5-2%. У мужчин потеря КМ составляет ежегодно 0,5%.

Ф а к т о р ы риска остеопороза: 1.возраст; 2.пол;

- 3.этническая принадлежность (белая и азиатская раса);
- 4.субтильное телосложение (небольшой рост и масса тела);
- 5.снижение массы тела в пре- или перименопаузе более чем на 10%, либо снижение роста более 4 см;
- 6.нарушение соотношения веса и роста (индекс Кетле);
- 7.курение, злоупотребление кофе, чая, алкоголя, наркотиков;
- 8.малая и чрезмерная физическая нагрузка;
- 9.дефицит кальция в диете;
- 10.дефицит вит. Д;
- 11.гастрэктомия, массивная резекция тонкой кишки;
- 12.вегетарианство или злоупотребление мясной пищи;
- 13.отсутствие регулярной половой жизни и беременностей;
- 14.продолжительное кормление грудью, многочисленные роды, ранняя менопауза;
- 15.длительное потребление некоторых медикаментов (диуретики, антациды, аминазин);
- 17.длительная иммобилизация;
- 18.гипокинезия.

У пожилых людей выделяют следующие **формы остеопороза: первичный и вторичный.**

К **первичному остеопорозу** относят **климактерический и старческий (сенильный остеопороз)**. Остеопороз климактерический развивается у женщин в менопаузу в результате резкого снижения синтеза эстрогенов. Сенильный или старческий остеопороз развивается одинаково часто, как у мужчин, так и у женщин после 70 лет, в основе его лежит гипокинезия, дефицит витамина Д и белка в рационе.

Вторичный остеопороз возникает на фоне лечения глюкокортикостероидами, тиреоидными гормонами, гепарином более 3 месяцев, применения лучевой терапии. Кроме того, остеопороз развивается при дефиците белка, кальция, аскорбиновой кислоты в рационе, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, синдроме Иценко-Кушинга.

Остеопороз условно подразделяется на **генерализованный и региональный**. Встречаются **редкие формы остеопороза: ювенильный, идеопатический,**
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТЕОПОРОЗА

Выделяют болевую и безболевою форму остеопороза.

Безболевая форма длительно протекает бессимптомно и иногда первое обращение приходится через 10—15 лет от начала заболевания. Пациенты отмечают быстрое наступление усталости в положении сидя, испытывают потребность в длительном отдыхе. Иногда первым признаком заболевания может явиться перелом той или иной кости.

При **болевогой форме** пациенты жалуются на боли в длинных трубчатых костях, ноющие боли в пояснице, боли опоясывающего характера в грудной клетке, брюшной полости. Боли усиливаются при физической нагрузке, кашле, нередко принимают опоясывающий характер. Возможно появление болей в брюшной полости, которые иногда приводят пациента на операционный стол(!). Болевые ощущения имеют разную степень выраженности, от незначительных тупых болей до сильнейших болей. В некоторых случаях отмечаются периодически появляющиеся болевые приступы, длящиеся несколько дней, проходящие самостоятельно, при этом после болевой атаки отмечается снижение роста пациента. Характерным является то, что болевые ощущения плохо снимаются анальгетиками. Реже встречаются боли в суставах. Отмечаются также нарушения походки, хромота.

Объективно. При осмотре отмечается сутулость, углубление шейного лордоза и грудного кифоза, отмечаются глубокие складки кожи по боковой поверхности туловища. Отмечается снижение роста на 10—15см.

Сенильный остеопороз развивается после 75 лет, в основе его лежит недостаточное питание, нарушение функции ЖКТ, низкая солнечная инсоляция, у таких пациентов обычно наблюдается непереносимость молока.

При развитии остеопороза возрастает риск падений у геронтов, связанных с постуральной гипотензией, нарушением координации, ограничением подвижности, снижением мышечной силы, а также с приемом некоторых медикаментов.

Диагностика основывается на опросе, клинических данных. Большое значение придается лабораторным исследованиям:

- биохимическое исследование крови на наличие кальция, фосфора, магния, щелочной фосфатазы;
- исследование мочи на наличие метаболитов вит Д;
- биопсия кости.

Из дополнительных методов применяются:

- рутинная рентгенография позвоночника;
- двухфотонная абсорбционная рентгенологическая денситометрия, которая уже выявляет 2- 5% потерю костной массы, в то время как обычная рентгенография выявляет изменения костной ткани, когда потеря костной ткани достигает 20-30%;
- ультразвуковая денситометрия — метод менее затратный и не дающий лучевую нагрузку на пациента;
- рекомендуется также ультразвуковая биолокация скелета;
- компьютерная количественная томография.