

Особенности течения заболеваний сердечно - сосудистой системы у лиц старшей возрастной группы

Растущий интерес к проблемам гериатрической кардиологии объясняется следующими факторами: Относительным и абсолютным увеличением числа заболеваний ССС лиц старшего возраста. Более четкими представлениями о роли физиологических возрастных изменений в развитии таких заболеваний, как атеросклероз, ГБ и др.

Необходимостью учитывать клинические особенности болезней ССС в формировании другой возрастной патологии, уметь организовать профилактику этих заболеваний у лиц старшей возрастной группы.

Атеросклероз - одно из наиболее распространенных хронических заболеваний, проявление которого чаще встречается в старших возрастных группах. Однако, атеросклероз не является проявлением биологии возраста. По современным представлениям это различные комбинации изменений интимы, сочетающиеся с изменением меди сосудистой стенки.

Атеросклероз - мультифакторное хроническое заболевание, хар-ся системным поражением в основном артерий, обусловленное обменными нарушениями в тканях сосудистой стенки.

Атеро - с греческого переводится «густая каша». Термин атеросклероз был предложен в 1904 г. Маршанд, для обозначения специфического типа склероза артерий. Этиология атеросклероза не установлена. Описано более 300 факторов, которые способствуют развитию этого заболевания. Все факторы делятся на две группы: факторы, на которые можно воздействовать и факторы, на которые воздействовать невозможно. К факторам, на которые невозможно воздействовать относятся: пол, возраст, наследственность. Известно, что мужчины заболевают атеросклерозом в более молодом возрасте, чем женщины. Лица, у которых ближайшие родственники имеют в анамнезе инфаркт, инсульт, имеют большую вероятность заболеть атеросклерозом.

К наиболее важным факторам, на которые можно воздействовать относятся: гиподинамия; ожирение; артериальная гипертензия; личностное в поведении человека; дислипидемия; СД; недостаток витамина С.

Доказано, чем больше факторов имеется в сочетании, тем более высок риск заболевания.

В то же время все перечисленные факторы риска не могут дать полного объяснения развития заболевания. В настоящее время существует ряд теорий, объясняющих патогенез атеросклероза:

Вирусная теория;

Теория повреждения и накопления;

Неопластическая теория.

Некоторые исследователи отводят большую роль в развитии атеросклероза недостатку витамина С. Аскорбиновая кислота угнетает биосинтез холестерина и снижает его способность накапливаться в сосудистой стенке, недостаток витамина С приводит к активации синтеза холестерина и способствует его накоплению в сосудистой стенке.

Атеросклероз является фоновым заболеванием, усугубляющим течение многих других заболеваний органов и систем, способствующим развитию инвалидности пациента.

Клинические проявления атеросклероза имеют зависимость от локализации патологического процесса.

Наиболее частыми проявлениями атеросклероза являются: атеросклероз сосудов головного мозга, коронарных сосудов, сосудов нижних конечностей, мезентериальных сосудов, сосудов сетчатки и др. В клиническом течении атеросклероза выделяют два периода:

1.начальный (доклинический);

2.период клинических проявлений, которые зависят от локализации процесса, а также стадии заболевания и факторов, отягчающих течение заболевания.

Диагностика основывается на клинических проявлениях, определении уровня липидов. Это наиболее информативные методы, по сравнению с рентгенологическими исследованиями и данными ЭКГ.

Артериальная гипертензия

Вспомните особенности гемодинамики у пожилых людей и вы придете к выводу, что возрастной фон с одной стороны создает предпосылки для развития гипертензии, а с другой стороны препятствует чрезмерно стойкому повышению АД. Поэтому среди пожилых людей встречаются следующие формы артериальной гипертензии: 1.гипертоническая болезнь, 2.систолическая гипертензия, 3.атеросклеротическая или ишемическая гипертензия.

Атеросклеротическая артериальная гипертензия - является реакцией организма на ишемию органов мишеней, чья функция зависит от достаточного кровоснабжения.

У геронтов эта форма гипертонической болезни может проявляться в виде вариантов:

1. Наиболее часто встречается кризовый вариант, проявляющийся внезапным повышением АД на фоне нормального самочувствия. Нередко периоды нормального АД длительны, и пациенты теряют бдительность,

прекращают контролировать АД, прекращают прием медикаментов, что часто заканчивается трагедией.
2. У некоторых пациентов отмечается трудно купируемая утренняя гипертензия. В настоящее время есть опыт предупреждения ее путем применения β -блокаторов в вечернее время.
3. Стабильно-диастолический вариант течения, при котором отмечено значительное повышение диастолического давления при незначительном повышении систолического.

Диагностика: ишемическую гипертензию редко распознают врачи. При диагностике необходимо обратить внимание на время возникновения заболевания, чаще всего это возраст 50—55 лет. Кроме того, необходимо обратить внимание на наличие различных дислипидемий, проявлений атеросклероза. Такие данные могут свидетельствовать об ишемической гипертензии. Исследование таких пациентов очень дорого и доступно не всем, так как требует применения дорогой, порой дефицитной аппаратуры.

Для дифференциальной диагностики необходимы изотопная рентгенография, УЗИ, экскреторная урография для исключения обструктивной уропатии.

При наличии неврологической симптоматики необходимы компьютерная или магниторезонансная томография.

(!) Прогнозы: Кризовое течение заболевания быстро приводит к гибели пациентов, так как при данном варианте отмечается различные геморрагические проявления (инсульт, следующий один за другим).

Поэтому, если лечение эссенциальной гипертензии позволяет продлить жизнь человека, то лечение ИГ (изолированной гипертензии) должно улучшить качество жизни человека, предупредив развитие у него сосудистых катастроф и их последствий.

Во многих эпидемиологических и клинических исследованиях установлено, что высота АД является одним из факторов риска тяжелых сердечно - сосудистых осложнений, таких как инсульт, инфаркт миокарда, ХСН и другие. С увеличением возраста частота этих осложнений увеличивается, резко ухудшается качество жизни пациентов и ухудшается прогноз. В связи с этим возрастает необходимость рациональной терапии АГ

Особенности течения ИБС у геронтов

Под термином «Ишемическая болезнь сердца» объединяют группу заболеваний, в основе которых лежит относительное или абсолютное нарушение коронарного кровообращения разного генеза, приводящее в итоге к хронической сердечной недостаточности.

Обращаемость населения пожилого и старческого возраста по поводу ИБС составляет 25,5%. Особенно это касается возрастной группы в 60—74 г. В тоже время многие пациенты этой группы сохраняют творческую активность, продолжают работать. Поэтому своевременное выявление заболевания и хорошее лечение может значительно улучшить качество жизни человека.

Особенности течения ИБС у геронтов связаны с возрастным ремоделированием сердца, проявляющимся прогрессирующей атрофией миокарда, физиологическим склерозом сосудов миокарда. Развивающееся ремоделирование сердца способствует нарушению, как систолической, так и диастолической функции сердца. С возрастом нарушается электролитное равновесие в миокарде (снижается содержание К, повышается содержание Са, Na), что способствует развитию аритмий у геронтов, возрастает склонность к дисфункции синусового узла. Падает регулирующее действие блуждающего нерва, что приводит к автономной деятельности проводниковой системы сердца. На увеличивающиеся стрессовые нагрузки сердце не способно реагировать адекватно. Все эти изменения приводят к снижению ударного объема на 20%, из-за чего страдают жизненно важные органы.

С возрастом растет периферическое сопротивление сосудов из-за физиологического склероза и развивающегося атеросклероза. В результате возрастает гемодинамическая нагрузка на сердце, повышается потребность миокарда в кислороде. Падает способность коллатеральных сосудов расширяться в ответ на различные стимулы.

Основные факторы риска, способствующие развитию ИБС, те же, что способствуют развитию атеросклероза: 1) гиперлипидемия; 2) повышенное АД; 3) курение; 4) изменение реологических свойств крови. Все выше перечисленные изменения со стороны ССС в сочетании с факторами риска, приводят к тому, что ИБС у геронтов имеет несколько иные проявления.

Стенокардия (грудная жаба, *angina pectoralis*) — заболевание, проявляющееся периодически возникающими приступами загрудинных болей, обусловленных преходящим нарушением коронарного

кровообращения. Стенокардия у пожилых пациентов имеет ряд особенностей:

1. Болевые ощущения в момент приступа менее интенсивны, но более продолжительны. Стенокардия напряжения не дает выраженной вегетативной симптоматики, но часто протекает на фоне высокого АД;
2. Часто признаком стенокардии у геронтов может быть не боль, а одышка;
3. Очень часто на фоне СН приступы стенокардии проявляются нарушением ритма;
4. Иногда у геронтов доминирует цереброваскулярная недостаточность;
5. У большинства геронтов ИБС протекает в форме стабильной стенокардии различных функциональных классов.
6. Очень часто загрудинные боли у геронтов могут возникать в результате грыжи диафрагмального отверстия диафрагмы.
7. Практически у всех пациентов наблюдается сопутствующая патология, это может быть атеросклеротическая энцефалопатия, облитерирующий атеросклероз, ХОБ, СД и др.

Диагностика заболевания из-за этого затруднена. Большое значение в диагностике имеют: анамнез; ЭКГ; суточное кардиомониторирование; коронарография; сцинтиграфия с Та.

Особенности инфаркта миокарда у геронтов

Инфаркт миокарда — заболевание, которое характеризуется образованием некротического очага в сердечной мышце в результате абсолютного нарушения коронарного кровообращения, приводящего к резкому падению сократительной способности миокарда. Как и стенокардия, инфаркт миокарда у геронтов протекает атипично(!).

Особенности клинической картины:

ИМ предшествует длительный стенокардитический анамнез.

У геронтов чаще наблюдаются мелкоочаговые и распространенные инфаркты;

В 52% случаев ИМ развивается на фоне артериальной гипертензии;

Реже встречается типичная болевая форма ИМ, чаще наблюдается безболевая форма ИМ(!);

Часто ИМ протекает под маской грудного радикулита, или ОРВИ;

Болевая форма ИМ часто сопровождается быстрым развитием острой левожелудочковой недостаточностью;

Часто сочетается с цереброваскулярной недостаточностью;

На фоне ИМ часто развиваются психозы, объясняемые резким нарушением мозгового кровообращения;

Чаще развивается кардиогенный шок, смертность от которого составляет 90%;

Часто на фоне ИМ наблюдается дебют СД;

Часто наблюдается рецидивирующее течение ИМ;

Повторные инфаркты в гериатрической практике наблюдаются в 33% случаев.

Диагностика затруднена из-за возрастных особенностей, поэтому у лиц старшей возрастной группы необходим регулярный контроль ЭКГ в течение трех суток, а затем не реже чем через 5-7 дней.

Анализ крови не дает достоверной информации из-за сочетанной патологии, поэтому диагностика в основном базируется на анамнезе, клинике и данных функциональной диагностики.

Хроническая сердечная недостаточность — это патологическое состояние, обусловленное падением сократительной способности миокарда, приводящее к нарушению гемодинамики.

Проблема ХСН с каждым годом становится все более актуальной. Это связано с угрожающим ростом числа больных, при этом следует учесть, что количество пациентов со скрытой СН, примерно, в 5 раз больше.

Выделяют в основном четыре механизма развития ХСН:

1) наличие препятствий к изгнанию крови; 2) поражение миокарда.

3) перегрузка объемом;

4) нарушение наполнения полостей сердца

Кроме того, выделены механизмы прогрессирования ХСН, к ним относятся:

а) продолжающееся повреждение миокарда; б) ремоделирование миокарда; в) сопутствующие аритмии;

г) ятрогенные факторы.

Выделяют три стадии в развитии ХПН. Классификация ХСН предложена Н. Д. Стражеско и В. Х. Василенко. Согласно Нью-Йоркской классификации выделяют четыре класса ХСН.

Клиническая картина у геронтов имеет ряд особенностей, что затрудняет диагностику:

1. Встречаются случаи гипер- и гиподиагностики этого состояния, так у пациентов могут отсутствовать жалобы на одышку из-за низкой активности(!).

2. Тахикардия может быть связана с сопутствующей патологией, как и отеки.

3. Чаще ХСН у геронтов протекает в виде масок:

1). аритмическая маска — проявляется нарушением ритма, пациенты при этом предъявляют жалобы на сердцебиение, перебои в деятельности сердца, редкое биение сердца.

2). абдоминальная маска — проявляется чувством тяжести в животе, метеоризмом, запорами, снижением аппетита;

3). легочная маска — доминирующий симптом одышка, кашель, усиливающийся в горизонтальном положении

и при физической нагрузке;

4). церебральная маска — проявляется немотивированной слабостью, сонливостью, нарушением ориентации, раздражительностью, резкими колебаниями настроения, эпизодами длительного беспокойства.

5). почечная маска — отмечается олигурия, высокое содержание белка в моче с наличием форменных элементов. Стойкие отеки, рефрактерные к диуретикам.

Диагностика затруднена. Большое значение имеет эхо-кардиография, позволяющая выявить нарушения систолической и диастолической функций желудочков сердца.