

Особенности заболеваний системы дыхания у лиц старшей возрастной группы

Возрастные изменения бронхолегочного аппарата имеют большое значение в развитии легочной патологии. Частота хронических заболеваний возрастает с пятого десятилетия жизни. Наиболее частыми заболеваниями с этого возраста являются БА, хронический бронхит, ХОБЛ, пневмония, рак бронхов.

Бронхиальная астма

Бронхиальная астма — хроническое рецидивирующее заболевание дыхательных путей, на фоне измененной реактивности бронхов, проявляющееся приступами удушья, дыхательным дискомфортом, сопровождающимся обратимой бронхиальной обструкцией, обусловленное наследственной предрасположенностью к аллергическим заболеваниям.

Бронхиальная астма протекает у геронтов на фоне хронического бронхита, а также сердечно-сосудистой патологии и как самостоятельное заболевание встречается редко. В развитии БА имеют значение следующие механизмы: изменение реактивности бронхиального дерева; спазм бронхов; гиперсекреция; дискриния мокроты; отек слизистой оболочки бронхов.

У геронтов преимущественное значение имеет отечный компонент, нарушающий бронхиальную проходимость, причем отек носит перманентный характер. Большая роль отводится инфекции, что подтверждается смывами из бронхов. У геронтов реже встречается атопический вариант БА.

Причины заболевания неизвестны. Факторы риска:

1. Наследственность;
2. Болезни матери в период вынашивания беременности;
3. Особенности развития и болезни (диатез, аллергии);
4. Особенности конституции: гиперстеники болеют чаще, нормостеники и астеники — реже;
5. Особенности труда и быта взрослого человека (курение и пребывание в атмосфере курящих людей, пылевые поражения бронхиального дерева); врожденные и приобретенные дефекты иммунной системы.

Клиническая картина:

Заболевание протекает атипично у большинства геронтов, что связано с наличием сопутствующей патологии. Типичные приступы БА встречаются у 30% пациентов. Чаще наблюдаются *атипичное течение, проявляющееся приступообразным затруднением дыхания особенно в ночное время, затруднение дыхания с удлиненным выдохом, приступами мучительного кашля также в ночное время.*

На фоне БА быстро прогрессирует вторичная эмфизема, ухудшается деятельность сердечно-сосудистой системы, что резко снижает качество жизни пациентов и иногда приводит к смерти.

В диагностике БА большое значение отводится: умению выспрашивать пациента и анализу полученной информации; имеет значение клиника заболевания; иммунологическое исследование крови (снижение Ig A, G, повышение E); R- логическое исследование; исследование функции внешнего дыхания; бронхоскопия по показаниям; анализ крови; исследование мокроты.

Результаты кожного тестирования не имеют большой диагностической ценности, т. к. возникновение БА у геронтов не связано со спец-кой аллергической сенсibilизацией. В виду высокого риска осложнений не рекомендуются провокационные медикаментозные пробы(!).

Хронический бронхит

Хронический бронхит — это неспецифическое диффузное, длительно текущее, необратимое поражение бронхиального дерева, в большинстве случаев проявляющееся гиперсекрецией и нарушением дренажной функции воздухоносных путей, нередко приводящее

к прогрессирующему нарушению бронхиальной проходимости и развитию легочного сердца.

Ведущую роль в развитии заболевания занимает курение и вдыхание агрессивных газов —90% случаев, в 9% случаев причиной бронхита может быть инфекция, 1% — причина бронхита неизвестна.

Вдыхание агрессивных газов, курение приводит к гибели реснитчатых клеток, вызывает изменение вязкости мокроты, нарушает дренажную функцию бронхов. Присоединение инфекции приводит к инфекционному поражению слизистой.

У геронтов обострение хр.бронхита провоцирует инфекция.

Клиническая картина заболевания у геронтов чаще всего

1)не имеет ярко выраженной симптоматики и

2)зависит от нарушения бронхиальной проходимости. Выделяют: **бронхит проксимальный** (поражаются крупные и средние бронхи) - встречается чаще у курильщиков, протекает длительно благоприятно, долгое время не привлекает внимания ни самого пациента, ни врача; и **дистальный с синдромом обструкции**. При дистальном бронхите поражаются мелкие бронхи 6-12 генерации. При этом бронхите на первый план выступает одышка. Кашель сухой, мучительный с трудно отделяемой скудной мокротой. При объективном исследовании отмечается эмфизематозная грудная клетка. Перкуторно выявляется коробочный звук. Дыхание резко ослаблено. Над всей поверхностью выслушиваются сухие поющие хрипы.

3)При обострении заболевания чаще отмечается ухудшение течения сердечно-сосудистой патологии.

4)Интоксикационный, лихорадочный синдромы и отдышка выражены.

5)Чаще отмечается головная боль, сонливость, кашель с трудно отделяемой мокротой.

6)Мокрота преимущественно отхаркивается по утрам, имеет слизистый или слизисто-гнойный характер.

7)При объективном исследовании отмечаются сухие жужжащие хрипы на фоне жесткого дыхания.

В диагностике заболевания большое значение имеет сбор анамнеза. Необходимо обратить внимание на признаки обструкции:

1.появление сухих дистантных хрипов при изменении t окружающей среды;

2.появление приступов пароксизмального кашля при переходе их теплого помещения в холодное;

3.усиление одышки при изменении погодных условий;

4.удушье, возникающее при выходе на холод. В диагностике имеет значение:

5.исследование мокроты.

6.бронхоскопия по показаниям.

7.рентгенологически выявляются признаки эмфиземы, расширение прикорневого рисунка за счет формирования легочной гипертензии.

8.применяют спирографию, пневмотахометрию.

Хроническая обструктивная болезнь легких. (ХОБЛ)

Хроническая обструктивная болезнь легких относится к наиболее распространенным заболеваниям человека, что обусловлено табакокурением, загрязнением окружающей среды, и часто повторяющимися респираторными инфекционными заболеваниями.

В развитых и развивающихся странах отмечается устойчивая тенденция к увеличению ХОБЛ. Наиболее важным фактором в распространении этого заболевания является увеличение количества курильщиков, как активных, так и пассивных, неограниченная реклама табачных изделий и отсутствие федеральной программы борьбы с курением.

К большому сожалению, пациенты, страдающие ХОБЛ, обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания, когда уже выражена дыхательная недостаточность и сформировалось легочное сердце.

Сегодняшний уровень знаний не позволяет ставить задачу излечения от ХОБЛ, но предотвратить прогрессирование заболевания — реальная задача. Подсчитано, что современные затраты на лечение и содержание этих пациентов в 50- 80 раз(!) превышают затраты на предупреждение этого заболевания. Это требует разработки стратегии первичной и вторичной профилактики этого заболевания.

ХОБЛ — хр. медленно прогрессирующее заболевание, характеризующееся **необратимой обструкцией бронхов** и является комбинацией хр.бронхита и эмфиземы, вызванное патологической реакцией легких на различные вредоносные частицы и газы. **Осложняется ДН и гипертензией в малом круге кровообращения, хр.легочным сердцем. У лиц страдающих ХОБЛ часто наблюдается синдром сонного апноэ, что может привести к гибели пациента(!).**

Патофизиологические механизмы:

- обструктивный тип нарушения вентиляционной функции бронхов;
- мукоцилиарная дисфункция;
- депонирование нейтрофилов в слизистой дыхательных путей;
- ремоделирование бронхов;
- поражение паренхимы легких.

Морфологические изменения: хронический прогрессирующий воспалительный процесс дыхательных путей и легочной паренхимы, существующий вне зависимости от степени тяжести заболевания.

Факторы риска:

- ✓ активное и пассивное курение (90%);
- ✓ длительное воздействие на дыхательные пути поллютантов;
- ✓ загрязнение воздуха внутри помещений (пыль, токсические испарения и др.);
- ✓ наследственная предрасположенность .

Распространенность и смертность .ХОБЛ является одной из самых распространенных причин болезненности и смертности во всем мире, а потому представляет собой значимую медицинскую и социальную проблему. Установлено, что ХОБЛ в мире среди мужчин и женщин всех возрастных групп составляет 9,3 и 7,3 на 1000 населения. При сопоставлении данных за 1990 и 1999 гг. установлено, что болезненность среди женщин имеет тенденцию к росту, и за последние годы увеличилась на 69% именно среди женщин, в то время как среди мужчин болезненность возросла за эти годы на 25%. По данным Национального института здоровья США, показатели смертности невелики среди людей моложе 45 лет, но в более старших возрастных группах смертность занимает 4 место.

Эксперты Международной программы «Глобальная Инициатива по ХОБЛ» выделяют следующие **стадии заболевания**.

Стадия 0. повышенный риск развития ХОБЛ.

Стадия I. Легкое течение ХОБЛ.

Стадия II. Среднетяжелое течение ХОБЛ.

Стадия III. Тяжелое течение ХОБЛ.

Стадия IV. Крайне тяжелое течение ХОБЛ. На этой стадии резко страдает качество жизни пациента, а обострения могут быть угрожающими для жизни, болезнь приобретает инвалидизирующий характер.

Ключевые симптомы, позволяющие поставить диагноз заболевания.

Хронический кашель, беспокоящий пациента постоянно или периодически, чаще наблюдается в течение дня, реже ночью. *Кашель — ведущий симптом заболевания, его отсутствие может свидетельствовать о снижении кашлевого рефлекса.* Кашель наиболее ранний симптом, который *появляется уже к 40—50 годам.* К этому возрасту у пациента отмечается появление сезонных респираторных инфекций, которые долгое время не привлекают внимание лечащего врача. Впоследствии кашель становится ежедневным, редко усиливающимся по ночам. Кашель чаще малопродуктивный, может носить приступообразный характер и *провоцироваться вдыханием* табачного дыма, резких ароматических веществ, переменной погоды и другими факторами окружающей среды.

Хроническая продукция мокроты: в начале заболевания количество мокроты небольшое. Мокрота имеет слизистый характер и выделяется в основном в утренние часы. В мокроте могут появляться комочки секрета. При обострении заболевания количество мокроты может возрасти, она становится более вязкой, меняется ее цвет, возможно появление зеленоватой или желтоватой по цвету мокроты, имеющей неприятный запах.

Одышка, персистирующая, имеющая прогрессирующий характер. По мере прогрессирования заболевания может варьировать от ощущения нехватки воздуха при привычной физической нагрузке до выраженного проявления в покое. Усиливается при нагрузке и во время респираторных инфекционных заболеваний. *Одышка, ощущаемая при физических нагрузках, возникает в среднем на 10 лет позднее кашля.* Одышка чаще приводит пациента к врачу, так как ограничивает его трудоспособность, вызывает состояние тревоги и беспокойства. Пациенты чаще обращаются к врачам с жалобами на кашель отделение мокроты и нарастающую одышку.

Могут появляться неспецифические симптомы: недомогание, нарушение сна, усталость, слабость, депрессия. Возможно повышение температуры тела.

Чем более выражена тяжесть ХОБЛ, тем более тяжело протекает обострение. Результаты объективного исследования пациента зависят от степени выраженности обструкции и эмфиземы, наличия осложнений, таких как дыхательная недостаточность и хроническое легочное сердце. Однако не всегда объективные данные отражают степень тяжести заболевания, и отсутствие соответствующей симптоматики не свидетельствует об отсутствии болезни(!). При осмотре выявляется цианоз, порой диффузный, изменение формы грудной клетки, она может приобретать эмфизематозную форму, отмечается западение межреберных промежутков во время акта дыхания.

При перкуссии отмечается коробочный звук, нижние границы легких опущены примерно на одно ребро. Ограничивается экскурсия нижнего края легких.

Аускультативная картина зависит от преобладания эмфиземы или бронхиальной обструкции. Тоны сердца прослушиваются с трудом.

При эмфиземе отмечается ослабленное везикулярное дыхание. При обструкции отмечаются сухие свистящие хрипы, усиливающиеся при форсированном выдохе, имитации кашля, а также в положении лежа на спине.

При клиническом исследовании выявляется удлиненная фаза выдоха в дыхательном цикле. Над легкими при перкуссии определяется легочной звук с коробочным оттенком. Отмечается увеличение размеров печени, формируются периферические отеки, что свидетельствует о развитии легочного сердца. При аускультации — ослабленное везикулярное дыхание, рассеянные сухие хрипы.

При тяжелом течении выделяют две клинические формы заболевания:

1) эмфизематозную и

2) бронхитическую формы ХОБЛ. На практике чаще встречается

3) смешанная форма заболевания.

Для подтверждения диагноза необходимо тщательно собрать анамнез жизни и выявить факторы риска: курение и табачный дым; промышленная пыль и химикаты; дым домашних отопительных приборов и гарь от приготовления пищи.

Диагноз должен быть подтвержден данными исследования функции внешнего дыхания: спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия.

Рентгенологическое исследование позволяет провести дифференциальный диагноз. При легкой ст. заболевания R-изменения, как правило, не обнаруживаются. Особенно информативна R-диагностика при эмфизематозной форме заболевания.

Применение КТМ не является обязательным диагностическим исследованием. Чаще КТМ применяется для подтверждения бронхоэктатической болезни.

ЭКГ позволяет исключить кардиальный генез респираторной симптоматики.

Из дополнительных методов исследования имеют значение: шаговая проба, эхокардиография, бронхоскопия, подсчет индекса курящего человека.

Острая пневмония

Пневмония — это большая группа заболеваний разной природы, характеризующаяся поражением альвеол с инфильтрацией их клетками воспаления и экссудацией, приводящая к развитию острой дыхательной недостаточности.

О. пневмонии у геронтов регистрируются довольно часто (пневмония — «друг» стариков), протекает у геронтов крайне тяжело, требует длительного пребывания в стационаре и дает высокую смертность, каждый 10-ый геронт умирает от этого заболевания, летальность от пневмонии варьирует от 10 до 33%.

Этиология: в силу объективных и субъективных причин причина пневмоний устанавливается примерно в 50% случаев. Наиболее вероятными возбудителями пневмонии являются стрептококки, пневмококки, энтеробактерии, золотистый стафилококк, микоплазмы, хламидии, палочка Фридендера, легионеллы и др. При помещении в стационар возрастает вероятность микстинфекции.

Факторы риска: возраст старше 60 лет; изменение видового состава микробной флоры, колонизирующей носоглотку; нарушения мукоцилиарного транспорта; дефекты неспецифического иммунитета; не рациональное питание; *сопутствующие заболевания как легочной (хр. бронхит, ХОБЛ и др.), так и сердечно-сосудистой систем (ИБС и др.), СД, хронические инфекции МВС; снижение физической активности пациента; массивная, порой необоснованная медикаментозная терапия.*

Выделяют пневмонии **1)внебольничные** и **2)внутрибольничные**, причем внутрибольничные пневмонии протекают наиболее тяжело, часто заканчиваются летально (до 80%).

Клиническая картина крупозной пневмонии у геронтов имеет ряд особенностей, что затрудняет диагностику, назначение лечения.

Клиническая картина пневмонии (как правило, стертая и обостряющая течение фоновых заболеваний) складывается из ряда синдромов, имеющих разную степень выраженности, что затрудняет диагностику, назначение лечения:

1. Лихорадочный синдром у геронтов выражен неярко. Для его выявления необходимо регулярное измерение t тела пациента каждые 2 часа(!).

2. Интоксикационный синдром проявляется наиболее ярко, у пациентов отмечается выраженная слабость, потливость, тахикардия, падение АД, одышка, снижение аппетита вплоть до полной его потери (анорексия), тошнота и иногда рвота(!), расстройства сознания и др.

3. Синдром плевральных болей выражен нечетко.

4. Слабо выражен синдром кашлевой. Все это затрудняет диагностику.

5. Наиболее ярко проявляется синдром поражения других органов и тканей: очень часто **на первый план выступают симптомы поражения миокарда, печени, почек.**

6. Данные физикального обследования скудны. Аускультативно изредка можно на фоне жесткого дыхания выслушать крепитирующие хрипы на ограниченном участке, что требует внимания со стороны врача и фельдшер. *Велика роль медицинской сестры, именно наблюдательная медицинская сестра может обратить внимание врача на необычное поведение пациента.*

В диагностике заболевания большое значение придается четко собранному анамнезу. Поэтому беседа с родственниками, окружающими пациента, другими лицами позволяет опытному медработнику ориентироваться в патологии. Большое значение имеет и рутинная рентгенография. Пневмония всегда должна быть подтверждена рентгенологически. Необходимо обращать внимание на картину крови — лейкоцитоз, а также на *необычное поведение пациента: сонливость, заторможенность, делирий, жалобы на необычную слабость, недомогание(!)*.

В течение пневмонии выделяют следующие этапы:

1. бактериальная агрессия — проявляется интоксикационно-лихорадочным синдромом;
2. клиническая стабилизация — характеризуется легочной инфильтрацией и интоксикационным синдромом;
3. функциональное восстановление — период после снижения интоксикационного синдрома с восстановлением функции внешнего дыхания;
4. морфологическое восстановление — длится до одного года.

Осложнения пневмонии у геронтов: инфекционно-токсический шок; ДВС; развитие острой сердечно-сосудистой недостаточности; развитие миокардита, пиелонефрита, гепатоза.

Исходы пневмонии:

1. выздоровление с дефектом, полного восстановления не происходит;
2. переход в хроническое течение;
3. смерть в 33- 60% случаев.

Рак легкого, метастатические опухоли легких.

Рак легкого - неоднородная группа злокачественных опухолей, характеризующаяся агрессивным ростом, ранним и обширным метастазированием.

Этиология первичного рака легкого: действие канцерогенов; проф. вредности; курение; хр. заболевания легких. Мужчины болеют в 5-6 раз чаще.

В 25-30% всех случаев - метастатические опухоли.

Патогенез: ведущая роль отводится нарушению и извращению регенерации бронхиального эпителия.

Легко метастазирует по лимфотическим путям в л/у корня легких, трахеи, средостения; гематогенным путем – в кости, головной мозг, печень, надпочечники.

Клиническая картина: Длительный скрытый период: немотивированная общая слабость, снижение аппетита (принимают за симптомы старения); постепенное снижение веса и др. В дальнейшем появляются легочные симптомы: легкий сухой кашель (преимущественно в ночное время), затем – приступообразный и мучительный; мокрота, часто гнойная, с неприятным запахом; кровохарканье, которое и приводит к врачу; боли в груди разнообразного характера (у 50-80% больных) – при прогрессировании процесса; одышка (в начале рефлекторного характера, позже – из-за механической обтурации).